

# Sylva. Frutetum. Collis.




CVM PRIVILEGIO.

PARISIIS  
Apud Franciscum Stephanum.

I 5 3 8

20 IL EST PERMIS A FRANCOYS  
 Estienne faire imprimer ces petit3 traictez inti-  
 tulez sylua, Frutetum, Collis. Et deffences de les  
 reimprimer, ou uendre dedès deux ans prochai-  
 nement uenant, sur peine de cōfiscation desdict3  
 liures, & amende. Faiēt le septiesme iour de Iu-  
 ing Mil. cinqens. XXXVIIII.

I. I. De Mesmes.



UNIVERSITE DE PARIS

2 1 1 1 1 1 2  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# C. Stephanus,

ADOLESCENTVLIS BO-  
narum literarum studiosis S.

Non possum, etiam occupatissimus, non obtemperare studijs vestris, imò potius cōuicijs: quibus nunc tandem adducor vt aliquid succi sui tēporis suffurer, quod vobis impertiar: ne (quemadmodum dicere soletis) dimidiatus is labor noster exeat, quem alioqui non omnino infelicitèr cœptum hactenus iudicastis. Noui vestra ingenia: & quid ijs imprimis arrideat: tātum hoc mihi æque ac vobis grauissimum est, quòd non, quemadmodum vterq; nostrum vehementer cupit, integra res, hac opera perfici possit. Id yero quo minus præstare queam, facit aliud negotium, quod iamdudum mihi est præ manibus: adeo quidem molestum, vt vix tantum otij relinquat, quo libere respirem. Ab eo autem si quando vacare licebit: dabo operā vt omni ex parte satisfiat desiderijs vestris. Itaq; bono animo semper estote: & interea dum à maiori negotio quiescam, syluam accipite, quam vestro seminario & item arbusto subnectetis: vt post arbores domesticas & priuatas, etiam rusticas ac syluestres agnoscatis.

Tenetis animi nostri sententiam, nunc quid hoc libello vobis daturi sumus, paucis accipite, Sylua quid sit primum docebimus,  
a. ij,

nostro more, quæque eius genera, quoque pacto in nostrum usum reducantur. Inde ad glandium, gallarum & pilularum differentias procurremus, ut postea glâdiferas arbores primo, deinde reliquas, quæ passim in omnibus sylvis crescunt, explicemus. Quo in loco (quantum fieri à nobis poterit) insudabimus, ut etiam exoticas & externas arbores ab antiquis cognitatas, & quarum multa sit à bonis authoribus mentio, à nobis accipiat. Postremo verò, frutices & herbas fruticantes in ea sylvæ nostræ parte explicabimus quâ frutetum, è re nata, appellare licebit. Cui ob hoc potissimum monticulum siue collem subnectem⁹, & herbas reliquas omnes, quæ tum in sylvis, tum etiam in montibus (nam raros sine arboribus montes reperiatis) succrescunt, exponemus: ex authorum approbatorum sententia. Atque hæc tandem erit nostri instituti dispositio. Quæ si vobis tandem placebit, atque etiam digna videbitur quæ aut legi, aut intelligi debeat: satis magnum fructum percipisse videbimur & vestræ humanitatis & nostræ diligentiae.

# Sylua.

Prætermitemus primū breuitatis ergo, quæ in hac re vulgatiores videbūtur, ac min⁹ hodie recepta, & fortassis indigna, q̄ vt lōgiori sermone recēseatur: quēadmodū syluā à silēdo deduci, q̄ minime sileat, & huiusmodi plēraq̄. Item etiā ea quę ad vocabulorū interptatiōes magis spectant, veluti erunt dictiones à sylua natæ, Syluanus, syluestris, syluaticus, syluosus, & huius generis permulta: quæ omnia ex thesauris, aut cōmētarijs linguę latinę diligēs lector scrutabitur. Tantū ea explicabimus adoleſcētulorū nostrorū causa, quæ ad vocabulorū (de quibus sermo futurus est) cognitionē rariora iudicabimus, & magis necessaria, ac minus omnibus cognita, priusquam ad maiora tranſeamus.

Itaq̄ syluam vocabimus, satum arborū procerarum, tum ad materiā, tum etiam ad aprosalendos & sues ſaginādos factum, græci ὕλην vocant: quo vocabulo tam ipsam materiam, quàm etiam locum in quo crescit ac cæditur, intelligunt, *forest ou bois de haulte fustaye.*

Syluam cæduam appellauit Varro, quę tum ad vsum domesticum singulis annis, tum etiā ad ædificia quolibet quinquennio cēdebatur, & in eos vsus feri atq̄ excoli solebat, quemadmodum hodie quoq̄ fit apud nos. Alio loco (inquit) vt seras & colas syluam cæduam: alio vbi aucupēre. Vnde serere, & colere syluam, plan-

ter ou semer une terre en bois, & entretenir ung  
bois. item cædere syluam, tailler ou couper ung  
bois, recte dicemus & eleganter. Itaque etiam  
sylua cædua, dicetur vulgo, *ung tailliz*.

Sylua glâdaria Catoni libro primo dicta *ung  
bois a gland ou glanderaye*, nempe quæ (quem  
admodum iam diximus) animalium alendo,  
rum gratia feritur, vel ad glandem producen-  
dam: nam ea potissimum arboribus glandife-  
ris sata est ad pascua, quæ vulgus vocat *la pais-  
son*. hinc mittere porcos ad pascua dicemus:  
*mettre les pourceaux a la païsson*. quod præcipue  
ad calendâs Octobreis fieri apud nos solet: cū  
maxime glâdes maturæ ex arboribus sua spō-  
te decidunt: id autem est quod vulgus nostrum  
appellat glandē colligete, *cueillir le gland*. nepe  
dū porci ab Octobri ad Decembrē, per syluas,  
glande saginantur: statuto ob id præmio ijs ad  
quos syluæ attinent.

Conseminea autem sylua appellabatur, quæ  
multis arborū seminib⁹ ac varijs generibus cō-  
sita erat, quā eandē barbaricā syluā vocat Co-  
lumeila libro. 11. capite. 2. *bois semé ou planté de  
diuerfes sortes darbres*.

Quæ porro sylua vno tantū seminū genere  
serebat, ea quidē ab arboris genere quo sata e-  
rat nomē retinebat. Appellabāt enī antiqui vl-  
mariū, vlmorū seminariū. Plini⁹ lib. 17. cap. 11.  
*une ormaye*. sic & eupresserū dixit Cicero pri⁹  
de legibus, *bois plante de cypres*. itē etiā querce-

tū, *une chesnayē*. Varro, primo de re rustica, Si enim ad limitē quercetū habet, nō posses recte secundum eam syluam serere oleam.

Syluula vero dicetur vel inculta sylua, & in qua pauca supsunt arbores, vel sylua quę paruum soli aut terreni tractū cōtinebit. *ung bocquet*. Sunt (inquit Columella) quibus cordi est, vel in syluulis tamaricū aut sirporum frutetis immorari: *buysson*.

Saltus, latiori quadā significatione syluā cōplectitur, sed quæ intermedia pascua cōtineat, & interdū etiā casae, in quib⁹ tū saltuarij quos vulg⁹ vocat, *gardes de bois*, tū etiā pascuarij habitāt *gardes de bestail*. Vnde Verg. Saltus vacuos dixit, tertio Georgi. & Pyrenęos salt⁹ Cęsar primo belli, civilis appellauit tractū ī Pyrenęis mōtibus (qui Hispanias ab Italijs diuidunt) syluosum, & in quo plus syluarū esset q̄ vel camporum vel pascuorum.

Nemus, ex etymo, syluā significat amœnam, vel amœnitatis gratia cōsitā, quæ etiā partī oblectatiōis partī pascuorū causa excolitur, & πὸ τῆς νέμης, pascō: *bois de plaisance, ou parc en bois*. Vnde Virg. Didonē & Aeneā in nem⁹ oblectationis gratia secessisse finxit lib. 6. Aeneidos.

Quēadmodū autē amœnitatis gratia nemus cōferebat, ita etiā antiq̄s lucus religionis ergō cōsit⁹ erat. illic enī solebāt sacra noctu facere, in honorē Dianæ, vel alicuius demortui luctū. in lucis etiam demortuorū tumulos erigere so-

*Lucus inus, in D. de Religione, lib. 1. a. iij.*

lebāt, q̄ arborū opaca dēſitate diutiſſimo ſerua-  
rentur. Vnde nemini licebat arborum ramos,  
nedum ipſas arbores, à luco eximere: quapro-  
pter opacus erat & admodum obſcurus, quòd  
nō eſſet cæduus. Hinc etiā tractum nomen,  
quòd in luco fas non eſſet lucare, vel colluca-  
re arbores: vel quòd in eo nō æquè luceret at-  
que in alijs ſyluis. Virg.

Nulli certa domus, lucis habitamus opacis.

Sed iam relicta vocabulorum interpretatione,  
ad arborū genera quę in ſylua conſeri ſolēt ve-  
niendū: ac primum de glandiū generibus, poſt  
hęc autem de glandiferis arboribus dicamus.

## Glandes.

Glandis vocabulum interdum latius patet  
( inquit Caius iureconſultus ) & ſub ſua ſigni-  
ficatione, omnes fructus continet: exemplo græ-  
ci ſermonis, apud quos omnes arborum ſpeci-  
es ἀκρόδ'ρῶα appellantur, cum alioqui proprie-  
tiones, & ſummitates arborum ſignificent.  
Interdum ſtrictius ſumitur glandis appellatio,  
& fructum quercinum tantum ſignificat, quē  
admodum apud nos vulgò, *du gland*. Proprie  
autem ſi intelligamus: glandem ( quam græci  
balanum vocant ) certe accipiemus pro fru-  
ctu quem quercus, robur, eſculus, fagus, cer-  
rus, ilex, & ſuber ferunt: hiſpido calyce per ge-  
nera plus minùſve cōplectēte. Quarum omniū



differentiæ priores, sumuntur à sexu, situ, & sapore: aliæ à magnitudine & cutis tenuitate, item etiam figura, quæ alijs rotunda, alijs ouata, alijs acutior est: præterea à colore candido vel nigriore: quin & pediculi breuitas proceritasque differentiâ adfert glandibus: de quibus vberius in arborû descriptione tractabimus.

Glandibus arborû veteres victitasse, & opes fuisse multarum gentium alta etiâ pace fruetum, nihil est quod longiori sermone recenseamus: vnde etiam Palladius de glandium collectione & asseruandarum cura meminit, id autem per autumnû fiebat: quod opus fœmineis & puerilibus operis celebrabatur facile, more baccarum. atque hinc lege duodecim tabularum cautum erat, vt glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere. Quinetiam cum annonæ premeret inopia, proditum est arefactas glandes ac deinde in farinam molitas, ad panis vsum venisse. Certe memini nostros Gallos campanos pertosienes, plurimû appetere faginas glandes, & ijs seu delicatiori quodam cibo victitare solere: est enim omnî dulcissima, qua etiam obsessos milites, in multos dies durasse tradunt historiæ. Ea apud Hispanos secûdis mensis apponitur. Alias glandes nonnulli in cinere tostas edunt. Cæterum glandium calycibus & corticibus (si sic appellare mauis) aut etiam ipsis exsiccatis integris, præsertim immitiorib<sup>9</sup> (vt cerreis) antiqui(in,

quit Suidas) solebāt igni alimēta præbere. Quā  
rū q̄a plurim⁹ vsus erat ī balineis, ideo balneū  
græci βαλανείον appellarūt παρὰ τὸ τὰς βα  
λάνης αὐτῶν: hoc est, à succēdēdis balanīs, vt vel  
ps p̄ toto accipiat, vel etiā tota glās significet.

Quæ autē ad reliquā glandiū significatiōē  
spectāt, id cursim subnectem⁹, Theophrastum  
lib. 5. cap. 15. glādes à forma, testacea animal  
cula appellare quæ ī rimis cauernisq; saxorū ge  
nerātur, augētūq; incremēto admodū celeri.

Glandes igitur, prædictarum arborū fructus  
præcipua quadā significatiōe dicūtur, quanq̄  
& fruct⁹ castaneæ arboris, Græcis Iouis glans  
appelletur: de qua ī seminario dixim⁹. Quin &  
fructui arboris myricæ similis, in Aethiopia,  
Thebaide & Arabia nascentis, inquit Diosco  
rides, græci balani myreplicæ nomen dede  
runt, hoc est glandis vnguētariæ, quodd eius pu  
tamine institores vnguētarij vti soleant odo  
ris gratia, Plinius myrobalanum appellat.

Cæterū etiā balanos Theophrasto dicitur ar  
bor, à fructu nomē trahēs: grādis, incorrupta,  
& magna: cōsurgens folio myrti, longiore tan  
tū: caudice carnosō, nō recto, sed cōtorto: fru  
ctum ferens magnitudine cappari similē, cuius  
putamine cōtuso vnguētarij solent vti odoris  
gratia: alioqui nuclei fructuū sūt īutiles. mate  
ries arboris robusta, vsu præcipue nauali ī Ara  
bia nascēs. Itaq; (īquit doctissim⁹ noster Ruel  
lius) multū à veritate deficere vidētur, qui nucē

odoratā quā vulg<sup>9</sup> vocat moschatā gręci moschocaryon *noix muguette* hac glāde vnguētaria cōprehēdi putēt, lōge pfecto differētē, & vterib<sup>9</sup> vt existimo, nō admodū cognitā. cū multū intersit iter nucē odoratā, & glāde vnguētaria, quēadmodū ī semīario vberime docuim<sup>9</sup>.

## Myrobalani.

Myrobalanus itaq; quā Plinius vocauit, vel balanus myreplica, hoc est vnguētaria glans, fruct<sup>9</sup> erit arboris quā quidā adipson, & sicim sedet, alij palmā Aegyptiā, Theophrastus balanum vocat. Glans est magnitudine & aspectu capparis, aut nuci poti<sup>9</sup> auellanæ similis. Quādo autē multa sunt huius genera, nō erit inutile paucis ea recēfere ex Ruellio. ac primum de antiquorum generibus dicemus.

Myrobalanū Arabicā, quā etiā Syriacā vocarūt: antiqui bonitate olei qđ exprimit alijs ppo fuerūt. Eaaūt est duplex: mōtosa, viridis, tenuis, ac spissior petrēa nigrocortice, nucleo cādido.

Myrobalanus Thebaica, ab iisdē antiquis estimata est, copia olei cāteras antecellere.

Troglodytica myrobalanus omnium apud antiquos vilissima fuit.

Aethiopicam myrobalanum, sunt qui superioribus prāferant, nascentē in agrestibus. Est autem ea glans nigra, nec pinguis, nucleo gracili, sed liquore, qui exprimitur, odoratori.

Aegyptia myrobalanus, pinguior, crassiori cortice rubet, & quamuis in palustribus exiliat, breuior tamen sicciorque est.

Antiquitas hoc genere myrobalanorum contenta fuit, de quibus sic inquit Aëtuarus author græcus. Fructus (ait) ij nobiles plerisque ad nos ex Aegypto, Syriæque deportantur: callo corporis compactili, osse intus lignoso: quorum nonnullos vocant flauos, alios cepulos, quidam magnos malunt appellare, alios nigros: ij comuni omnium sermone myrobalani nomine veniunt: quod nomen vulgus nostrum inuersum, ac corruptum vocat myrabolani *des myrabolans*.

Posteritas atque adeo ætas nostra myrobalanorum genera sic distinxit.

Myrobalanos luteas vocat, quæ ex herbaceo colore, flauescunt: spissæ quidem ex, ponderosæ, exili nucleo, cute crassa.

Myrobalanos alias à colore cæruleo Indas vulgus appellauit, quæ sunt solidæ, sine nucleis, oliuæ forma: ex autem nigra à quibusdam, & à recentiore Græcia Damasoniæ nominantur.

Myrobalani quas vulgus cepulas vocat, cæteris ampliores sunt, grauiorésque, carnosæ, & ex fusco rufescentes.

Myrobalani empeliticæ, siue emblicæ appellatæ, sunt cute ossibus hærente, lapillorum penè figura, angusta, colore in cinerem languente.

Myrobalani boletzicæ dictæ, eadem quasi forma spectantur qua empeliticæ, non adnumerantur.

tur tamen cum ijs, sed seorsum positæ sunt.

Hæc in studiosorum gratiam breuiter perstrinximus: ne quid eorū quæ cognitu dignissima erant (quanquam fortassis altiora, q̃ vt adolescentulis nostris proponi debeant) paulo negligentius prætermisissē videremur. Veniamus ad gallas & pilulas.

# Gallæ, Pilulæ,

## AMENTA.

Gallæ quæ à græcis *κνκίδες* vocantur, à nostris vulgo *noix de galle* minus cōmunem habent significationem q̃ pilulæ. Sunt enim arborum tātum glandiferarum: pilulæ etiam aliarum, atq; adeo fruticum: quæadmodum mox interpretabimur. Itaque omnes arbores quæ glandē ferunt, gallam etiā producūt, quā inter fruct⁹ Dioscorides ausus est connumerare.

Est autem galla, pilula, inæquali superficie, leuis, salebrosa, præter legitimum fructum in glandiferis arboribus proueniens: præsertim Martij exitu, vel sole de geminis exeunte: atq; id noctu præsertim, crescītq; vno die, & si occupetur æstu (inquit Theophrastus) protinus arefcit, neq; ad iustum modum grandescit, vt nuclei fabæ magnitudinem non excedat: præter resinaceam tamen, quæ & nigra dicitur, de qua mox agemus.

Multiplices sunt gallarum differentiæ, aliæ

enim solidæ sunt, aliæ perforatæ, quædam nigra, quædã cãdidæ, aliæ maiores, aliæ minores. Harum autẽ vsus est vulgo in omnis generis atramenti confectione, siue id sutorium siue scriptorium siue impressorium fuerit.

Galla solida, quæ & omphacitis Dioscoridi appellatur, parua est, nodosa, pondere valens, nullo foramine peruia.

Galla perforata, leuis est admodum, & plana, hoc est nullis nodis glabra.

Gallas eas quæ fungosæ & flauæ grãdescũt, à rusticis vocari onocidas prodidit Galenus, quasi asininas, quòd ignauæ sint, & omnium minus efficaces.

Galla quæ candida est, corijs perficiẽdis vtilis: ea est quæ vno die crescit, arescitq; protin<sup>9</sup> feruenti æstu, nec iustam implet magnitudinem, sed intra fabæ capacitatem subsistit.

Galla nigra, ea est, quæ & resinosa & resina, cea dicitur: diutius viret, crescitq; interdum ad mali magnitudinẽ. Ea tingendis corijs aptissima est, flagrat sine oleo, & si cauernulis transluceat, minus bona iudicatur.

PILVLAE, & gallas, & quas græci cachryas vocãt (nõnulli amenta) & interdũ etiã paniculas, cõprehẽdunt. Sũntq; peculiaria quẽdã parturiẽtis arboris indicia, quæ nec fructũ nec florem proprie dixeris. crescũt potissimũ hyeme, vere autẽ dehiscunt in flauescẽtes squamulas, & prodeunte folio caduæ, pereunt: cuiusmo-

di vides in abiete : pilulam enim fert , quæ nucleū cōtinet, qui hyeme quidē crescit, vere aperit: pilula tota cadit, cū folia cōperūt crescere.

Varij autē generis sunt pilulæ in glandiferis arboribus. Sunt enim quædā nucibus haud ab similes, intus habentes flocculos molles, lucernarum luminibus aptos, qui & probè, gallæ nigræ modo florent : græci huiusmodi pilulam pylon vocant.

Est & alia cū capillo comigera pilula: verno tempore melligenum succum tum gustu tum etiam tactu præbens.

Gignunt & alæ ramorum quercus, pilulas sine pediculo sessiles, parte cōcaua adhærentes, versicolore, quæ prominentes quosdā vmbilicos vel candicantes , vel dispersa nigrarū macularum varietate notatos præmonstrent: medijs partibus colore cocci rutilantibus: quibus apertis, putris inanitas cernitur, aliquādo putrescunt.

Gignunt etiā è folijs prædictæ arbores (sed rariuscule) conuolutas pilulas quasdā, cōpressas, & oblōgas, foliorū tergo adhærentes, aquosis int<sup>9</sup> bullis cādicātes: quæ muscas creant: eæ dū maturescūt, tādē ī gallas occallescentes durant.

Hæc autem descriptioni glandiferarū arborum præposuimus, tanq̃ necessaria quæ primū intelligerentur: cū alioqui postponi ceu ipsarū arborū fructus debuisse quisq̃ iudicauerit. Sed quia inter describendum fieri non potest, quia



hæc vocabula semper incidant: idcirco cognitionem glandium, gallarum & pilularum, dignam esse duximus quæ arborum glandiferarum descriptioni præponeretur.

# Arbores glandi-

## FERÆ.

Arbores glandiferas Plinius lib. 16. negat vna voce comprehendi posse latino sermone, quemadmodum græco vocabulo *δρυς*, & antiqua voce Saron, à qua Saronianus sinus: & Saron in Arcadia nemus trans Ladonem fluvium. Sanè græci dryos vocabulo, omne lignum significant. Vnde gerandryon pro veteri & am busta quacunq; arbore, quasi vetus ramale.

Robor antiquis, recentioribus robur, generale quiddam vocabulum est Theodoro Gaza glandiferarum arborum. quæ quia grandes esse solent, & admodum vastæ ac proceræ: ideo factum ut latini robur pro fortitudine, tum animi, tum etiam corporis sumpserint: vnde robur ætatis Ciceroni dictum, pro consistenti, & firma ac perfecta ætate: & robur accusationis, pro firmamento & argumento potiori. Item etiam eidem robustus animus dictus, qui constanter, & infractis animi viribus quæcunq; pericula perfert: sic & res robusta vetustate, & malum robustum pro inueterato eidem authori dictum, quarum omnium locutionum exempla ex the-



sauro linguæ latinæ tibi defumes.

Robur igitur (vnde roboreus & roburneus adiectiua) quatuor glandiferarum arborum genera potissimum cōplectitur. Nempe quercum, quæ græcis hemeris dicitur: item robur proprie dictam, quàm græci dryon agrian vocant: æsculum, græcis platyphyllon dictam: & cerrum, quam græci ægylopa appellant: de quibus arboribus, necesse est vt nunc agamus.

Q V E R C V S, Festo dicta, quodd id genus arboris graue sit ac durum, etiam in ingentem euadat amplitudinem: græcis hemeris appellata, quam aliqui placidam interpretantur: alij mydion vocant: Roboris genus est, trunco neque erecto, neq; læui, neq; excelsō: sed caudice in orbem comoſo, contorto sinuosōq;: conſurgit multis ramorum alis concaua: materie quidem robusta, sed quæ fago sit infirmior: glande omnium mæxima & dulci, vnde Macedones quæ dulcem glandem producat quercum, etymodryon appellarunt, quasi dicas veriquercum.

De quercus auiditate crescendi, & quemadmodum etiã in planis nascatur, & in mari rubro, deque pertinaci eius odio cum olea & iuglåde: & quo pacto p inoculationē bona pyra aliquando tulerit, visaq; sit fronde perpetua crescere: multis item alijs huiusmodi rebus, parū (mea sententiã) ad rem nostrā faciētibus, tacebimus hoc loco: & ad meliorū authorum

b.j.

sententiã lectores remitteremus, breuitatis causa.

A quercu deriuata (nam etiam hæc pueros  
rum causa dicēda sunt) quernus & querneus,  
vnde querna glans apud Virgilium, *gland de  
chesne*, & frons querneæ apud Columellam,  
*rameau de chesne*: item querceus & quercicus:  
vt quercea corona quæ ciuibus dabatur qui vi  
cerant in bello, apud Suetonium in Caligula:  
etiã quercica dicta Seruio: febris quoq; quer  
cera siue querquera Gellio, grauis & magna  
appellata. querculana item porta fuit Romæ  
iuxta collem quercubus consitum, quæ eadem  
viminalis dicebatur. Quercula præterea her  
ba dicta, quæ & trissago latinis, & Græcis: cha  
mædrys quasi humilis quercus, quod folia ge  
rat quercuum folijs similia, breuiora tamen,  
*de la germandee*. & his similia quæ tu ex dictio  
narijs requires.

R O B U R Theophrasto drys, & drys agria di  
cta, quasi sylvestris quercus: licet pro commu  
ni omnium glâdiferarum genere sumatur: ea  
tamen proprie putatur esse quæ dicitur *ches  
ne*. Itali vocem ferè integram retinuerunt *rono  
re*, nam quercum vocant *quercia*. Nostrum au  
tem vulgus nullum inter quercū & robur vo  
cabuli discrimen facit. Robur passim in syluis  
spectatur, folio latebrarum anfractibus sinuo  
sissimo: glande exigua: materie durissima. Hęc  
autem sola, præter fructum, gallam tum can  
didam tum nigram gerit. Fert & quædã veluti

mora plerūq; tauri caput imitātia: sed admodū raro: fert & hoc quod pilon appellant, superius in pilulis descriptū. Iam & aliud producit, effigiem colis repræsentans, quod quum fuerit perfectū, tauri caput etiā imitatur, fructu intus nucleis oliuæ simili. Parit & aliam inutilem pilulam cum capillo, item etiam quasdam alias versicolores, à tergo foliorum hæretes, de quibus superius.

Taceo hoc loco de melle, quod Hesichius nō alijs magis insidere frondibus q̄ roboreis tradidit: item de visco, quod in querneis frōdibus nascitur omnium optimum: vulgus nostrum vocat *guy de chesne*, Ion poëta dryon hyphear, hoc est sudorē quercus: sui enim generis planta est fruticosa, sesquipedalis, lenta, semper virens, grauis odoris, buxi folio, baccis exiguis, sine flore, tactu sequax, semper in arborib<sup>9</sup> nascens, præsertim quercu, robore, ilice, pyro, malōq; syluestribus, & terebyntho, nullis præter ea alijs. Taceo etiā agaricum, quod ipsa quercus quēadmodū aliæ glandiferæ arbores promittit. Est autem fungus candidus, odoratus, antidotis efficax, in summis arboribus nascens, noctē relucens, de quo tamē vberius in abiete. dicerem hic de boletis qui circa quercuū radices nascuntur probatissimi, nouissima gulæ irritamenta, circa robora autem admodum noxij, sed hæc, vt prolixiora, ita etiam parum à re nostra aliena viderentur. Itaque ad æsculum

veniendum.

**AESCULVS** Græcis platyphyllos, quasi quercus latifolia dicta, quod inter glandiferas arbores folij latitudine præstet, quanquam eandem non esse arborē æsculū & latifoliā videatur Plinius annuere, cum eodē in loco & æsculi & latifolię meminerit. Est autem robore proceritate & glande inferior: galla, visu quidē quernæ non dissimili, nisi quod leuior est: foliū gerit graue, carnosum, procerū, sinuosum lateribus: autumnō reddit fructum, si Virgilio credimus, & quātū corpore eminet, tantū radice in terram descēdit. Atque ut in summa dicā, Aescul<sup>9</sup>, glandifera arbor esse creditur, cuius fructu primæ ætatis homines vescerentur, & ab esca nomen traxisse volunt, quod ante cerealē frugem & vsum frumenti, mortalibus hæc arbor victum subministraret: cum tamen Theophrastus glandem illi amaram tribuat, quemadmodum lignum ædificijs inutilem dicit. ab æsculo æsculetum, dictum, qui locus erat siue sylua æsculis consita, cuius conferendi & excolendi rationem videto apud veteres agriculturæ scriptores.

**CERRVS**, Græcis ægilops, roboris species est, populo similis, excelsissima, & incultis locis amica, caudice recto, excelso, læui, per longitudinem robustissimo: Materia alioqui improba, nec nisi ærariorum officinis carbone dotata. glans illi tristis, horrida, echinato caly.

ce, castaneæ modo. Itaque à nullo præterquam à sue manditur, nec nisi aliarum inopia: sola è glandiferis arboribus fert panos arentes, muscoso villo, cauos, non è cortice modo, verum è ramis dependentes, cubitali magnitudine; odoratos: sphagnō siue sphachnon & sphascon appellant Acoles: item etiam bryon: nostri penem: Syri vuam dæmonū. Theophrastus macedonicam cerrū asprida nominat: vulgus nostrum appellat *du hestre* quasi herrum, c, litera in aspirationem mutata. abdicatur quoq; apud nos ædificiorum fabricis: vt quæ flexu & fractu infœlix habeatur.

**H A L I P H L O E O S** hoc est falsicortex siue euthyphlœos recticortex, dicta est arbor glandiferarum pessima: cortice & caudice crassissimo, & plæruncq; cauato fungosq;. Sola corde caret, nec alia putrescit in eo genere, etiam dum viuit. Quin & fulmine frequenter icitur, quamuis altitudine non excellat: ideo nunquā in sacrificijs veniebat apud Acoles. Eadē ferè semper sterilis, & cum glandem tulerit, amara est, quam præter sues nullum attingit animal, ac ne eæ quidem, cum aliud pabulū nanciscuntur. Materies eius ædificijs inutilis, atq; etiam carboni, breui enim putrescit (inquit Theophrastus) & concava inanisque redditur. Plura ex Ruellij vigilijs. Eam arborem me mini me vidisse plurimā in via Flaminia circa Vrbein. vt nulla arbor frequentior sit, in ea  
b. iij.

parte. videbis autem putridas plerunque huiusmodi arbores, excauatas, tactas de cælo. nullo præterea vsui præterquam ad muliebres soleas, suberis vice.

FAGUS Græcis *φηγός* dicta, ἀπὸ τῆς φαγᾶς. quod fagi glans edendo sit, vnde prisca homines glandibus præcipue faginis victitabāt, vulgo *fau ou fauteau*: sed & græca dictio etiam Hippocrati fructum siue glādem faginam significat, quam vulgus nostrū vocat *faine*. Inter glandiferas arbores (vt prius diximus) annumeratur fagus, ramet si fruct⁹ eius nihil habeat glandi simile: est enim nucleis haud dissimilis, triangula cute inclusus, vt parte postrema vtrinque lapidescat in duritiem. Cuius glandis mollitiem & delicatum vsum superius iam descripsimus. Cæterū arbor ipsa, assurgit caudice crasso, & in orbem comoso, neque ita procero: materie scabra, firmissima, molli, putrefactioni obnoxia. folio tenui & leuissimo, populo simili, celerrime flauescēte: & in cuius media plurimum parte, paruula gignitur bacca viridis, fastigio aculeato. Hæc ex descriptione Ruellij.

Cæterum fagi cortex in magno vsu apud veteres fuit. eō enim vasa vindemiatoria, & corbes messoriæ fiebant. nec non gutti, & vasa quibus in sacris prolibabant fagino cortice religionis ergo fieri solebāt: vnde Curius ille iurauit ex præda se nihil attrigisse, præter

guttum faginum quo litaret. Hinc etiam pastor ille Virgilian<sup>9</sup> in bucolicis, duo fagina pocula proponit arte Alcimedontis artificis ingeniosissime fabricata, & cælata.

Est alterius generis à superiore fagus, etiam fructum ferens: quam Græci oxyan (inquit Barbarus:) Lydi, myson vocant: Olympo eorum monte copiosam. Vnde Mysij populi dicti, vt Strabo inquit & Eustathius. Fructus ei<sup>9</sup>, glandis effigie, leuis: includitur cauliculo echynato quidem, sed blando, nec hispido, vt in castanea: cui tamen similis est dulcedine & succo.

Nascitur & fagus altera in montibus, candida materie, quæ ad multa perutilis est: nêpe ad carpenta, lectos, subsellia, mensas. eam esse puto qua nos hodie in operibus architectonicis vtimur.

Syluestrem fagum nostri (inquit Barbarus) scissimam appellant, quæ glandifera non est, similisque potius abieti. Nunquam vt Macedones arbitrantur, floret: sed erecta, læuis & enodis est: ligno colorato, robusto, neruoso: folio crasso, bifido, longiore quàm pyrus, in extremitate aculeato: radicibus nec multis, nec altis. Ea fagus in laminas est sectilis, vnde ad carinas nauium ab antiquis commendabatur, vt author est Theophrastus, item ad plaustrorum testudinem, vectabulorumque vilem fabricam.



Campestris fagus, nigra est materie, quapropter minus petita: Fructum habet montanæ similē. durat in aquis incorrupta, madefacta, que firmior redditur. Vtraque humidissima est: quamobrem ait Barbarus, lectulos qui ex ijs fiunt incuruari, cedentes ponderi.

**I L E X**, Græcis *πρίνος*: vnde *πρίνις* latinis iliceus, vel ilignus, vt ilicæ trabes Statio sexto Thebaidos: & ilignea frons quam Columella libro vndecimo bubus præbendam censet. Vulgus nostrum ilicem vocat *du houx ou housson*: vnde etiam ilicetum *une houssaye*.

Surgentem. focus excipit superba  
Vicini strue cultus iliceti (inquit Martialis)  
Glandifera arbor est, roboris magnitudine & folio, verum paulo minori, & pungentibus aculeis vtrinque armato, cortice ac caudice leuiori: materia compacta ac robusta: glandoso fructu, sed pusillo: radice multiplici, in altum acta. Fert præter glandem, granum quoddam puniceum, omnibus notum. item etiã viscum in ramis, vt reliquæ arbores glandifere. perpetua fronde viret, & in iustam arborem prosilit, cum sibi commodam nata est humū. Hac plæræque sylvæ Galliarum scatent, sed in multis locis tam pumila arbor, tamque crescendi pigra, vt inter frutices potius sit referenda, quibus sæpes viuæ in pagis passim construuntur, baccis sanguineis per autumnum rubet. Glandifera autem ilex Gallis certe rarior est,



quàm vt sæpe conspiciatur . Satam tamen in hortis suis Ruellius glande creuisse scribit, cingente robusteam frondem spinarum vallo. Eam existimat ilicem aquifoliam appelladam potius,quàm aliam herbam,quam Theophrastus cratægon, vel cratægona appellat, cui tamen hoc nomen aquifolij dedit Plinius, fortassis de ilice aquifolia intelligēs, cum neget succi quicquam habere aquifolij baccas.

Dores Ariam siue agriam arborem Theophrasto dictam pro ilice aquifolia vsurparunt, quos sequutus est Gaza in Theophrasti versione. Eā Arabes phellodryn nūcupāt quasi suberiquercum: arbor est inter robur & ilicem media naturæ: vt ilicem fœminam quidam affirmant dici debere, Dores agrestē ilicem: cuius materia (vbi deficit ilex) vtuntur in carpentarijs præcipue fabricis. Sed de Aria & Cratægo postea dicemus suo loco.

Est & alia ilex superiore minor, quæ coccifera appellatur, Narbonensi prouinciæ frequens, vbi nūc appellatur à rusticis *uermillon*, ab alijs Gallis *escarlate*. Frutex est paruus: ramis exilibus, & aculeato folio: rubens lenticulæ formæ: granum fert cuius succo pretioso tinguntur lanae, & purpureæ fiunt: aspectu coloris gratissimo, in rosis micante, imperatorijs paludamentis dicato: eundem fruticem Iones & Græcia tota coccum nominant. quo vocabulo etiam granum intelligunt, quod Mauritani, *quermes*

siue *alkermes* vocant, vnde quermesinus color qui quisquilio rutilat, *cramoisy*.

De loto arbore hoc loco dicerem<sup>9</sup> ppter foliorum cum ilice similitudinē: nisi priuata potius esset, quā syluestris: adeoque hodie in nostratibus hortis frequētiore quā in syluis: vulgo vocant *alysier*. præterea fructum fert, cerasum referentem, *des alyses*: vnde commodius visum est nobis eam arborem post cerasiorum ordinem in seminario describere, quā hoc loco. Lotus autē herba tam ægyptia q̃ syluestris, etiā quæ nostrās dicitur: inter herbas pratēses suo ordine describetur, nempe post trifolium.

**S V B E R** latinis, græcis phellos, vulgo *liege*, inter glādiferas arbores cōnumeratur. Arbor est caudicosa, parūmq; ramigera: admodū procera: auctūq; insignis: ligno robusto, cortice vnicè crasso, solito disrūpi: fraxini folio, sed oblongiore, perpetuo virēti: fructu glandoso, aquifoliæ glandi ppe simili. Vnde suberi, & ilici fœminæ à quibusdā vocatæ (quā supius phellodryn nominauimus & nōnulli nigrā ilicē appellant) eandē tribuit descriptionē Plinius. Alio tamen loco Suber, minimā esse arbore cōtendit, pessima glande, rara, cortice tantum in fructu præ crasso ac renascente, atque etiam in denos pedes vndiq; explanato. Cuius vsus est in anchoralibus nauium, piscantiūque tragulis, & cadorum obturamentis: præterea in fœminarū calciatu: quāobré græci, mulieres, non infacete

cortices arborum nominarunt.

Suber in Italia aut Gallia non visitur. Audio tamen hodie in Hispania reperiri humilē, folio ilicis, aculeato, tristi glande, cortice percrasso, & multis inanitatibus fistuloso. Cortex ad nos plurimus defertur, muniēdis aduersus frigoris iniuriam hyeme calciamētis. Ac de glādifera arboribus satis: nūc ad nostratiū syluarū arbores, deinde vero ad externas deueniemus.

# Arbores conife-

RAE, ET RESINACEAE.

Ne quid cōfundamus: utq; ordinē aliquē obseruare videamur, cōgeneres atbores vnā seponemus ab alijs. Itaq; post glādiferas, de coniferis dicendum, quæ omnes etiam resinaceæ vocabuntur, quodd resinam ferāt, nam etiam picæ inter resinarum genera ponemus.

Coniferæ arbores, græcis κωνοφόροι dictæ, à fructibus, quos ferè similes gerūt, nēpe turbina-  
tos, quæ est coni figura. κῶνος igitur, inuersum turbinem proprie significat græcis: à qua figura proprio vocabulo nuces pineæ primum appellatæ, atque adeo ipsa pinus: deinde vero à similitudine, alij etiā resinacearū arborū fruct⁹. vnde coniferas cyparissos dixit Ouidi⁹. Sed & nuces pineæ græcis strobili appellatæ, & cocali inq; Galen⁹ lib. 7. simpliciū, πῶμες de pins.

Resinaceæ arbores dictæ, resinam ferentes ac destillantes: quæ resina varie colligitur: siue combusta teda, vt in pinu (atq; hæc demū pix dicitur: vnde nihil aliud est pix q̃ fluxus combustæ in teda sua resinæ) siue ligno prægustato, vt in abiete & picea: siue radicibus, ramis & caudice vulneratis, vt in Terebintho.

Resinam autē græci ῥητίνορ καὶ πιτυίνην vocant *poiχ resinæ*. Quam autē resinam Columella corticatam appellat, hoc est, quæ vnā cū ipso cortice legitur ac decerpitur, græci ξυλῶς ῥηρ hoc est lignosam vocāt: Dioscorides Tyrrheniam, siue gallicam. Nam etiam à nationibus cognomen accepit, vt Cypriam & Syriacā quæ colore mellis attici erant plurimum laudauerint antiqui. item etiā Colophoniam, quæ præter cæteras fulua fuit.

Quinetiam ab arboribus dicta resina, vt larigna, abietina, terebinthina, &c. à larice, abiete, terebintho. Atqui ex ijsdem arboribus colligebatur duplex resina, alia quidē sicca, alia liquida, quemadmodum fusius ex antiquis authoribus habebis.

Resina cocta, prima tantum coctione pix appellatur, græcis πῖσσα, vulgo *poiχ*. Vnde zopissam aliqui vocant (inquit Dioscorides) derasam nauib⁹ resinam cū cæra, vulgo à nostris nautis *bray*. Bis autem cocta resina, græcis πάλιν πῖσσα dicitur: quasi bis pix, vel pix duplex, double *poiχ*, ou *poiχ* noire. quæ autem in

resinæ coctione primū fluit pix, ea liquida vocatur *poix de bourgoigne*: quæ postea remanet, appellatur sicca, *poix secche*. cremata autē pice vel in clybano vel alio loco occluso, quod sursum ascendit, & concrescit ex fumo, fuligo picis appellatur: qua atramenti impressorij confectores præcipue vtūtur, *fumee de noix*. pissasphaltion autem græci vocant quod nos picis bitumen: quo præcipue picantur naues, & doli, *poix grasse*. dicitur etiā pisselæon, oleum picinum, quod fit separato aquoso liquore qui supernatat pici, sicut serum lacti. Sed de resina hæc. Nūc ad nostrates arbores resinaceas.

NOSTRATES RESINACEAE ET  
coniferæ.

Quæ mastichem resinam & picem ferunt arbores, tãtam inter se destillãdi similitudinem, adeoq; multam in natalibus earumq; appellationibus misturam habent, vt nihil incertius prima frõte videatur in ijs authoribus qui eas descripserūt. Fruemur tamen in hac parte, doctiorū opera: & quod breuiter ac succincte de ijs perstringi poterit, paucis docebimus, ab abiete incipientes.

ABIES, arbor conifera & resinacea, græcis Elate dicta, gallis Sapin<sup>9</sup> & Auctum, *du sapin*. Vnde pars eius inferior quæ enodis, ciecto torulo, ad intestina opera comparatur, Vitruuio sapinea appellata est: superior autem quæ nodosa duriórque est, fusterna eidē authori dicta.

Sed & elate vocabulum, Dioscoridi, palmarum adhuc florentium fructus inuolucrum est: quo vtuntur pigmentarij institores ad domandum oleum: spissamenti loco. Galeno autem quod elate vocatur, tenerum est palmæ germen. Nā neq; Dioscorides neq; Galenus, vnquam in arborum censu, abietis meminerunt. Hinc factū est, vt Plinius in duodecimi voluminis calce, abietem cum ea palma confuderit, quæ medicinz confert germina, folia & corticem. Ait enim quandam esse abietem ad vnguenta per-  
rinentem, quam Elatem vocāt, alij palmam, alij spatē. Sed certe nulla pars abietis ( quod adhuc inuenerim ) vnguentis nedum medicaminibus addicta cognoscitur. Itaque videto quā non sit tutum Plinio in omnibus fidem adhibere, qui & vires & nomina, atq; interim descriptiones tum herbarum, tum etiam arborum ita confundat.

Abietis descriptionem ex Ruellio petito. & quas pilulas, quosq; fructus proferat, quosq; in loco crescere gaudeat, & quemadmodum semine tantum nascatur, quod est omnium coniferarum proprium, floreatq; croci colore circa solstitium. Videbis apud eundem duo esse abietis genera: marem & foeminam: quæ matre inter se differant: nam foeminæ materia est mollior, candidior, operibúsque facilior: in totum prolixior caudex: mari autem versicolor, latior, durior. Ea est arbor quæ ī Gallia Lugdu.

nenſi & ſuperiori Germania, nō ſolum in ædiſicijs , ſed etiam in domeſtica ſupellectile lignea vtuntur.

Abietis trūco, ad radicem vel interdum altius, vbi arbor & lignum carie tentatur, fungus vel adnatum quoddam grādiori fungo ſimile naſcitur, cui nomen agarico datum eſt, *de lagaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. quicquid exiſtiment nonnulli radicem eſſe cuiuſdā ſtirpis . eo noſtri medici hodie paſſim vtūtur in purgatorijs pharmacis. eſt autē duorum generum. mas, grauior, denſior, rotūdior, minus albicans. fœmina candidior dum frangitur, ac leuior : oſtenditque in ipſa fractione, ſtrias quaſdā, veſtigijs dentium in caſeo à muribus relictorum ſimiles. præſtantior eſt mare, quapropter medicis magis eſt i vſu. Creſcit etiam amnū agaricus in aquifolia arbore , & multis alijs glandiferis.

P I N V S græcis ( vt diximus ) *κῆνος* dicta, latinū quoq; in Gallia nomen retinet, *ung pin*, à pinnato foliorum cacumine . Arbor eſt vulgo nota. Folium gerit, capillamenti modo prætenue, longūmq; , & mucrone aculeatum: breui ſeta villoſum, pectinum modo diſſectum, promiſſāmq; materiam habet, candidam, & abieti ſimilem. Non niſi à vertice ramoſa eſt. nuceſ fert ſiue conoſ lignoſoſ , frequenti nucamento in turbinatam effigiem compactileſ: in quibus nuclei ſinguliſ cameratiſ toriſ includun-



tur. Fert pinus minimum resinæ, interdum ex nucibus ipsis. Vitis radicibus nō repullulat, in quo maxime à picea differt. Materies præcipua trabibus & plurimis vitæ operibus : expetitur quoq; nauigijs.

Duplex pinus:quemadmodum & abies,nempe mas , & fœmina.Mas sterilis,breuior, folio duriore.lignum habet retorridum,præcinctum medulla,durum,& ad fabrorum opera contortum. Fœmina,procera est,folijs pingitur molli bus,& simplicibus nec rigētibus,minus est tedacea,læuigatior ac probior cursu meatuum: gerit quam græci vocāt ægida, mellei coloris, pictorum tabellis immortalem, nullisque fissilem rimis.

Duo alia genera in Troade quidam faciūt: Montanam pinum,siue Idæam vocantes, quæ recta & celsa est,crassa materie,nucibus oblōgis, viridibus,sero dehiscentibus, pice copiosa. Maritimam,folio tenuiore,infirmioréq; cortice læuiore,& corijs vtiliore:nuce rotunda , & quæ breui aperiatur:valida & robusta materie.

PINASTER nihil aliud est quàm pin<sup>9</sup> syluestris:mira altitudine cōsurgit,& à medio ramosa est, sicut pinus à vertice:copiosiorē hæc radicē fundit in summo.Nascitur tum in montibus,tum etiam in planis.Itaq; quæ prius descripta est , pinus vrbana dicetur. Hæc autem syluestris.

Nuclei pinci,græce strobili dicuntur, vt iam



explicauimus. quanquam & strobilos, tripudij genus sit apud Iulium Pollucem. Galenus etiā coccalos vocat. Sunt etiam qui coccalos pro cocco gnidio accipiant. Nucem sapineam vocauit Columella, alij nucē pineam: vulgus nostrum pomum, siue malum pineum appellat: *pomme de pin*. Sunt autem eius quaterna genera, quæ tu longiori sermone descripta in Barbari commentarijs videbis.

**P I C E A**, quam græci *πίτυς*, & poetæ blotrē vocant (vt quidam rentur) arbor est pino congener, & huic ferè similis, folio breui, setę proximo, crassiore tamen, duróq; vt cupressus, immortali virore &c. In summa loricē quā postea describemus proxime imitatur, & pinū. Tātum hoc à pinu differt, quòd pinguior ac tenuior folio est, minus alta, minúsq; recta. Fert præterea conum minorem, & magis algētem: nucleos quoq; resina perfusos gerit, vltis etiam radicibus repullulat, quod pino non accidit. Frequens est in alpibus, funditque resinam plurimam, candida gemma interueniente, quæ thuri vsq; adeo similis est, vt pro eo sæpe fallat: gratissimum enim odorem habet. Huius speciem Theophrastus phthiropœon vocat, hoc est pediferam, tineosámq; quia totis paniculis nō prima tantum in parte, vt abietes, nucleos & minores & nigros habeat.

**P I C E A S T E R** quemadmodum & pinafter, picca syluestris est, quæ in Hispania visitur, ex

qua resinam, vnde pix coquatur colligunt.

Fructum piceæ Dioscorides à græcis pityida vocari tradit, itémq; pini: sed improprie inquit Galenus. Plinius pinastri nuces ita quoq; nominat. Hippocrates pityida resinam è pinu siue picea potius intelligit q̃ fructum.

**T E D A** proprie dicta, picearum generis arbor, in Illyria, græcis das siue dadion appellata. redundantior est humore, quàm reliquæ, aut pinus, aut etiam larices: parcior tamen, licquidiórque, quàm picea, flammis & lumini sacrorum grata: vnde nos improprie tedas appellamus, tum piceæ satiuæ partes imas, tum alia quoque ligna, quæ flamma olei vel picis illitu concepta, faculæ modo luceant.

**C V P R E S S V S**, inter nostrates arbores coniferas & resinaceas iure cõnumerabitur, hâc enim pleriq; Galliarum tractus habent. græcis *κνυπάριαρος* dicitur, ἀπὸ κνύφου παρείσσης τῆς ἀκρίμονας, hoc est à partu ramulorum pariliū (vt inquit Didymus) quodd ex æquo & ramos & fructus creet. Dictas etiam Cupressos *χαρίτις* idem prodidit, quodd nobis essent oblectamento: vel q̃ Charites Eteoclis filiæ, dē tripudio dearum subsilirent, in puteum ceciderint, quas deinde Tellus in arbores frondosas puellis similes, ad oblectamētum, & rei memoriam conuerterit. Diti sacra arbor, funeribus indicadis olim ante domos poni solita: ob hoc ei negotio dicata, q̃ semel cæsa nunq̃ regerminet.

net, præsertim à radice. Est admodum procera, caudice oblongo ac tereti, folio pini, sed carno fiore, amaro, neque ita pungenti, fronde indecidua, odore vehementi. cætera ex Ruellio.

Cupressi duo genera: foemina, quæ diu sterilis est, meta in fastigium conuoluta, neque repudiata, distinguendis pinorum ordinibus facile se consili culturae præbēs: historiales picturas tenui folio, breuique & virente superueſtiens. Cōtrā mas, spargit extra se ramos, deputaturque, & accipit vitem. Vterque sexus in perticas asseretque admittitur, amputatione ramorum, qui tertio decimo anno, singulis denarijs veniunt, apud Venetos.

Tarentinam cupressum Cato præcipue laudat, quoniā (ut Plinius arbitratur) è Creta venerit Tarentum. nam in Creta quocunque loco quis mouerit solum, nisi seratur alia, hæc sponte gignitur. Nonnulli tamen Creticam cupressum nomināt, alterum herbæ Sabine genus quæ græci *βράθυ* appellant, nos vulgo *ſauinier*, quæ sit cupressi folio. de qua in Hortulo nostro. Cæterum Milesia cupressus omnium laudatissima fuit antiquis.

Fructum cupressi galbulos, & nuces cupressi recte vocaueris, *noix de cipres*. Nam galbæ (ut ait Suetonius libro septimo) animalia sunt exilia quæ in æsculis arboribus nascuntur: unde primus Galba Romæ appellatus. Resina è cupressu etiam manat, qua si quid vnxeris, à

carie ppetuo vindicatur. Est enim sapore acerrima, quapropter tineas & vermiculos, teredinésque facile enecat.

Est & coactæ breuitatis frutex, quem chame cyparissos quasi pumilam cupressum vocant, hortis familiaris. hinc ab odore formæque foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris, vulgo nominamus *du cypres*, quodd quasi sit cupressi abortus: folio incano & perenni. Sunt qui a brotonum foeminam esse putēt, de qua in hortulo plura.

IUNIPERVS, etsi conifera non sit, tamen quia resinam thuri similem & bene olentem fundit, inter arbores resinaceas à nobis connumerabitur.

Iuniperum itaq; arceuthon græci vocarunt, nostri *genesure*. Arbor est duorū generum. Nēpe maior & minor: cortice membraneo, & qui sponte rūpatur: materie fulua, odorata: ex qua manat liquor, thuris odorē ac colorem æmulans: Coma viret perpetua, spinæque potius q̃ folio, vestitur: sed herbacea est sine flore, cæruleis baccis. In summa, cedro penè similis, tum effigie tum natura.

Duo apud nos inueniuntur genera iuniperi mōtibus vernacula: Vnum pumilum, humile, sessilib<sup>9</sup> in terra ramulis: alis parū se ab humo attollentibus: quibus spina pro folio est: radicibus summo cespite fusis: baccis primum virentibus, deinde per maturitatē nigris. Alterū alti

us adolescit, caudice p̄cero, cortice fragili, nec  
difficulter fathiscente: ligno fuluo, odorato, ra-  
mis latiorib⁹, aculeorū aceruo stipatis: baccis  
priori consimilibus. Cætera ex Ruellio.

Humor in iunipero ad lachrymæ modum  
concrescit, qui crematus nidorem odore thus-  
ri non cedentem expirat. Sunt è recentioribus  
græcis qui tradāt æstiuis tēporib⁹ irborē (quā  
iuniperum appellant) lachrymam sudare, quæ  
coloris officio durata, coeat in gummi. Hæc  
peculiari regionis vocabulo, *uernix* dicitur.  
Nunc ad externas arbores coniferas & resi-  
naceas.

## EXTERNAE RESINAE.

### CEAE ET CONIFERAE.

**L A R I X** (siue vt alij) *larex*, nomine pityos,  
hoc est piceæ, comprehenditur à Theophrasto.  
Arbor enim est magna, piceæ similis, crassior,  
læuiorq; cortice, folio villoso, pingui & denso,  
mollique flexu, materie præstâti, rubente, odo-  
re acri. Vitruuio arbor est folijs similibus pini,  
cuius materies prolixa, tractabilis ad intestinū  
opus, non minus quàm sapinea. Habet resinā  
liquidam, mellis Attici colore: quæ larigna re-  
sina dicitur. Nota est arbor (inquit idē author)  
municipibus qui sunt circa ripā Padi, & Adria-  
tici maris litora. Nunquam eroditur à tinceis,  
aut vermibus, & propter sui amaritudinem ab  
omni carie vindex est. Quin & (quod fortassis  
mirum videbitur) flammam ex igni nō concit-

pit: nec ipsius arboris materia per se ardere potest: nisi ( vt saxum in fornace ad calcem coquendam ) alijs lignis vratur: nec tamen tunc flammam recipit, nec carbonem remittit: sed longo spatio tarde comburitur: quod ex Cæsaris victoria patet, quam habuit circa Alpes dū castellum cui Larigno nomē erat ( propter laricū in ea vicinia frequētiā ) obsideret: nullus enim tacibus neque fasciculis virgeis inflā-  
 matis, potuit incendere pyram ligneā quæ ante castelli portam larignis trabibus erat constructa ad repellendos milites.

L E N T I S C V S à græcis *σχίνος* vocata: arbor est roboris magnitudine, sorbi folio: Dioscoridi glycyrizæ simili: terebinthi odore: acinis punicæ sylvestris, rubētibz, & vbi maturerint nigris, tantisper dum coquuntur rufis. Atque hæc dicitur lentiscus Chia, ( hoc est in Chio insula nascens ) cuius arboris resinam quidam ( vt inquit Dioscorides ) mastichem nominant. hæc autem gummi modo nascitur, nigra & candida: sed probatissima mastiche, Chia candida. quanquam mastichem Theophrastus dixerit etiam spinā ischinam ferre, & item aliam spinā in India & Arabia quam lamam vocant. Cæterum lentisci baccas schinides vocauit Hippocrates.

Aliam à Chia lentiscum se meminisse testatur Plinius lib. 15. cap. 24. quam Italicam lentiscum vocat. Ea autem erat folio pistacij, sed

minore, per extremitatem rubente: in summo  
 filiquæ pisorum, sed corniculi modo intortæ, in  
 quibus resina odoris iucundi continetur. Fru-  
 ctus sabuci specie in racemis dependet, qui ini-  
 tio rubet, postea nigrescit: Ter anno floret, &  
 coma pubet perpetua. Huiusmodi lentiscū no-  
 uisse etiā Ciceronē palam est, ex his versiculis  
 quos conscripsit,

Iam vero semper aridis, semperq; grauata  
 Lentiscus, triplici solita est grandescere fœtus:  
 Ter fruges fundēs, tria tēpora monstrat arādi.

Fuit lētiscus etiā Italis nostris recētiorib⁹ no-  
 ta. Nā & Barbarus refert, Romę in ruderib⁹ &  
 monumētis antiquis lentiscū ostendi, folliculis  
 inanibus, & deformibus: quibus cōfractis, culi-  
 ces euolare frequentes tradit.

TEREBINTHVS, græcis *τέρμινθος*, arbor  
 est circa Macedoniā & Idā in Troade, brevis,  
 fruticosa & cōtorta. In Syria aut (quę vt Plin.  
 tradit plurimā terebinthū habet, p̄sertim circa  
 Damascū, vbi mons terebintho nec alia sylua  
 scatet) magna & copiosa, decorāq; aspectu, fi-  
 delis ad vetustatē: materie admodū lēta & ve-  
 hemēter nigra, spissa, splēdida, ex qua calices in  
 Syria ad capulos detornāt, quo nomine Theri-  
 cles plurimū celebrat⁹ est: lauri penē folio, sed  
 denso, & rubēti, numerofo, ab eodē pediculo, in  
 versus digesto, vt sorbo, minus tamē angulato  
 oleosōq; vt fructus, & per ambitū laurinis fō-  
 lijs simili. Vnicū ad cacumen exit, & numerum



pārem cōturbat. Flos illi racemosus, oliuæ modo, sed puniceus: qui tandem in baccas exit, primum herbaceas, mox rubras, & tandem maturitate nigrantes: magnitudine fabæ resinofas, & sulphurofas, quæ si maturæ nō sunt, in aqua supernatant: maturæ & nigræ, sidunt. fert nuncamēta quædam caua, ceu folliculos, vltimi exemplo, emittentes quædam animalia veluti culices, lentorēque resinofum, qualis qui cortice erumpit. Radicem habet validam, in profundum actam. Vere concepto germinat, mēfibus tritici aut paulo ferius fructificat: perperua coma viret. Ex Terebintho resina liquida destillat, quæ omnes alias antecedit, Terebinthina appellata (inquit Dioscorides) cui bonitate succedit lentiscina: ad quam tollendam, arbor postquam germinauerit inciditur: id quod in omnibus alijs arboribus resinam fundentibus obseruandum est.

Terebinthi duo genera, mas & fœmina: quæ admodum aliarum quoque resinacearum. Mas sine fructu est, (inquit Theophrastus) fœminarum rursus duo genera: alteri fructus rubet lentis magnitudine: alteri pallidus est. χαλκοειδὲς quæ si herbaceū vocat. cū vite maturefcit, haud gravior faba, odore iucundior, tactu resinofus.

Terebinthū Indicā haberi refert Theophrastus: alijs supioribus ferè similē: fructu tantū diuerso, amygdalarū similitudine, suauitate p̄stātiori, quapropter incolæ his potius vtuntur.



THVS Græcis λίβανος vel δένδρον λίβανος dicta, in Arabia præcipue nascens: arbor est terebintho proxima: unde Antigono regi visa est esse ipsamet Terebinthus. Quidam lauro proximam faciunt, alij lentisco similem. Vnde quid in tanta varietate certi adducam non est in promptu: cum eius arboris facies à nullo latinorum, neq; etiam græcorū authorum hætenus exacte tradita sit. Plinius thuris arboris altitudinem ad quina ferè cubita reducit, ramis frequētibus, quales sunt aceri: folio pyri, sed multo minore, coloris herbacei, modo rutæ: leui cortice vt lauro. Philostrat<sup>9</sup> in Caucasii montis præruptis lateribus proceras arbores nasci prodit, è quibus manans thus destillet. cætera ex Ruellio.

Thus (inquit Barbarus) vel à græco theos, aut alio vocabulo sacrificiū significante θύειν deriuatur. Nam thure antiqui penates & diuos suos adolebant, vel dictum tus à tufis glebis, vt tunc latine scribi debeat.

Thuris arboris lachryma (siue resinā appellare voles) latinis, arboris nomen retinet: vulgo incensum appellatur, *de lensens*. Græcis & Galeno libanotus. Nam arbor ipsa (vt dixim<sup>9</sup>) libanos dicitur: à iuvene assyrio cui tale nomē erat, quem cum studiosissime deos colentē inuidi occidissent, dii in arborem (vt Græci fabulantur) conuerterunt.

Thuris autem multę species. Masculū, quod

aliqui à specie testium dici putant: idq; (modo non sit factitium & adulteratum) rotundum, friabile, solidum, intus albū est. Virgilius, Verbenasq; adole pingues, & mascula thura. vulgus nostrum id thus masculum, olybanum vocat, de lolyban articulo sumpto cū græco vocabulo ὁ λίβανος.

Thus foemininum, quod quidam mānosum vocant, molle est, in cortice, & intus flavesceēs. huic autem præcipua est gratia, cum inhærente lachryma, priore cōsequuta, alia se miscuit.

Minores thuris lachrymas, siue guttas Græci orobiam vocarunt: quēadmodum micas cōcussu elisas, mannam thuris, siue pollinem thuris. Corticem autē thuris appellarūt, omne id quod in arbore hæsit, ferramentōq; auulsum, corticis aliquam crustam secum detulit. Cætera ex bonis & probatoribus authoribus desumito. nam omnia complecti vt difficillimum esset, ita certe longissimum, & fortassis præter institutum.

**MYRRHA**, dubium non est quin sit arbor quam Græci *σμύρνα* vocant, lachrymam fundens quæ etiam nomen retinet *du myrrhe*. Sed qua sit specie ac forma, minus facile est in tam varia opinionū altercatione statuere, nostras enim non est: neque etiam nostris regionib<sup>9</sup> vicina. Nam apud Arabes, Troglodytas, Indos, & in Bæotia reperitur, quinis (inquit Theophrastus) cubitis humilior: minor thure,

caudice fruticoso, duro, & circa radicē intor-  
to, crassiore sura hominis, cortice læui: folio  
vlmi (oleagino inquit Plinius) scabro, crispo, in  
extremitate, vt iligneū aculeato. Huiuscemo-  
di arborem alij iunipero, alij lentisco, alij tere-  
bintho assimilarunt. Quapropter, quando cer-  
ti nihil hoc loco proferre possumus, superiori  
tantum descriptioni innitemur.

Huius arboris lachrymæ quam etiam myr-  
rham vocant, multa sunt genera, variè à Pli-  
nio, item etiam Theophrasto, ac Dioscoride  
descripta: pro tractuum in quib<sup>9</sup> arbor crescit  
varietate. Itaque (ne confusum quid adfera-  
mus) tantum de ijs dicemus, quæ magis neces-  
saria videbuntur, ea interim genera præter-  
mittentes, quibus hodie non vtimur, quib<sup>9</sup>q<sup>ue</sup>  
nullam operam damus.

Myrrha resina satis vulgo cognita, nedum  
officinis. Sed alia (inquit Theophrastus) stilla-  
titia est, alia fictitia. Stillatitia, hoc est quæ  
sponte ex ipsa arbore defluit, priusquam inci-  
datur (inquit Plinius) stacte appellatur: colo-  
re pallido, suauitate mira, sed amaritudine præ-  
cipua. Fictitia, vocatur plaste: atque ea est, quā  
antiqui in vnguenta conseruabāt, & cuius ex-  
pressionem, vnguēta faciebant (inquit Dioscori-  
des) odorata & pingua.

Staeten (ait Ruellius) officinæ, & medicorū  
vulgus, styracē liquidū appellāt, fortasse noīs  
vicinitate falsi: cum sit reuera styrax liquidus,

tusæ myrrhæ recentis exigua aqua conspergē,  
 præpingue serū,organo expressum:aut (si ma-  
 uis) pinguiſſimus myrrhæ flos, vel tortium  
 myrrhæ ius machinis extractum. Faciunt &  
 aliud styracis genus,quod calamitam vocant.  
 de quo statim postea.Stacten etiam antiqui (in-  
 quit Athenæus) pro Aegyptio vnguēto sum-  
 pserunt:quod & Persicis regibus dicatū erat:  
 id enim capite diadematis vice gestabant (in-  
 quit Dioscorides) Sed & stacte Græcis pro  
 lixiuo (quod cineris elotio est) sumebatur:  
 cui tamen dictioni tunc addunt vel subau-  
 diunt *κονίαμ*.

**S T Y R A X**, quam vulgus pharmacopolarū  
 appellat storacem, arbor est resinacei generis,  
 suæ etiamnum resinæ nomen præbens.Nasci-  
 tur præsertim in Syria,quanquam etiā in Cy-  
 pro,Creta,Cilicia & plerisque alijs locis inue-  
 niatur.Quod autem ad eius descriptionem at-  
 tinet.Arbor est cotoneæ malo similis: fructu  
 maiore quàm auellana, specie candidi pruni:  
 manat ab ea liquor coloris flavi, sordidi, resi-  
 nosi,albicantibus fragmentis,odoris perseue-  
 rantis:eum liquorem vulgus nostrum storacē  
 calamitam appellat, nescio qua ratione: liqui-  
 dus autem si fuerit (quemadmodum interdū  
 ex eadem arbore resina alia, alia liquidior pro-  
 fluit)storacem liquidum appellat,de quo pau-  
 lo antè in myrrhæ descriptione:

**B D E L L I V M** externa quoque arbor resi-

nacea, suæ etiam lachrymæ nomen præbens: in Arabia & Scythia crescit: nigra est, oleæ magnitudine, folio roboris, fructu caprifici, nec insuavi: manat ex ea humor quæ officinæ bdellium appellarunt, ut iam diximus: quanquam Galenus diuersam & arborem & resinam in Arabia & Scythia autumet. Sunt & alia eiusdæ resinæ genera, quæ tu à bonis authorib<sup>9</sup> collecta apud Ruellium & Barbarum videbis.

CEDRVS, solo tantum nomine apud nos cognita: vocamus enim vulgo *ung cedre*. Hui<sup>9</sup> autem descriptionis, tam varia est Theophrasti, Galeni, Dioscoridis, Pliniique opinio, ut vix aliquid certi de ea arbore adferre possimus. Tantū huic descriptioni hærebimus, quā Ruellius ex bonis authorib<sup>9</sup> protulit. Arbor est iunipero nō absimilis, folio duro, acuto mucrone, capillato, piloso, pungente, ramoso: baccis myrti, flauis, odoratis, esculentis: nouo fructu per autumnum cum anniculis pendente, ligno cōtorto, nodoso, frequētibus alis: medulla rubente, odorata: radicibus raris, per summa terræ dispersis. Theophrastus duo præcipua eius facit fastigia: alteram phœniciam, alteram lyciam appellans. Plinius longe aliter sentit. Diuersam quoq<sup>3</sup> habet opinionem Galenus, & itē Dioscorides, quemadmodum ex Ruellij commentarijs latius videbis.

Cedris autē (à Theodoro Gaza cedrula appellata) frutex est pusillus, arboreescens, frōdes

æternæ, in Phrygia & Arcadia nascens.

Cedria vero eidem authori, dissidet à cedro, estq; arbor folio pungente, mucronibus perinis de vt cedrus.

Cedrelate, cedrus est maior appellata Græcis, cuius duæ etiam traduntur species. Quæ floret sterilis est, fructifera, flore vidua, semine & cortice cupressi: triplici dotatur fructu, iam maturo, adolescente, & recens nato: lignum odore suaue est, ac æterna materie. Cedria etiã præter superiorem significationem, cedrelatæ tum resina, tum etiam pix appellatur: ita vt, si proprie loquamur, nihil aliud sit cedria, quàm cruda cedri lachryma.

Cedrium vero, succus est cedri, è teda eius concisa furnis, qui primus aquæ modo fluxerit in canali: & qui inde sequitur liquor pix appellatur. Confundunt tamen authores & cedrium & cedriam. Adeo nulla est vocabulorû proprietates, quæ perpetuo obseruetur.

Cedrides Galeno & Dioscoridi, cedri sũt fructus, quemadmodum Daphnides fructus lauri, *noix de cedre*: Plinius mala cedria appellat. parumper vrunt os gustâtis (minus tamẽ cedri lignum) vt etiam facile mandi possint: sed tamẽ si copiosius edãtur (inquit Galen<sup>9</sup>) caput tentãt, & dolorẽ creãt, atq; interanea vellicãt.

Ex malis cedrijs exprimebat apud antiquos oleũ, optimæ facultatis, quod illi cedrelæũ appellarunt, Columella cedriũ liquorẽ nominat,

Galenus cedream oleosam mauult appellare.  
Atq; hæc lector q̄ varia quāq; incōstātia sint,  
& ob hoc nō parū difficilia, quæso paulisper me-  
cū perpendito: tū autē facile videbis (ni fallor)  
quantū insudauerint ij qui hæc tibi collegerūt.  
REL IQ VAE A R B O R E S A C O N I,

FERIS, ET RESINACEIS, QVAE  
etiam in syluis passim crescunt.

De coniferis & resinaceis arboribus abunde  
diximus: superest vt de alijs agam⁹, quæ sylua-  
rum & montiū propriæ sunt: ac primum à no-  
stratibus incipiendum, vt deinde ad externas  
veniamus: ne quid confusum aut minus ordi-  
natum videatur.

NO STR A T E S.

T I L I A vulgo *tillet* Græcis *philura*, Theophrasto interdum *philyca*: Arbor est nota, fo-  
lio hederaceo, molliore, & in angulum acutius-  
rem rotundius ac pliciore: in orbē lente crispo  
atq; serrato: flore tātis per dū calyculo cōtine-  
tur herbaceo, vbi emerit, flauo: fruct⁹ magni-  
tudine fabæ similis, in quo semē prætenue q̄tū  
atriplicis, omnib⁹ animalib⁹ ingrātū, cū alioqui  
foliorum corticisq; succo (qui dulcis est) appri-  
mē delectētur. acinos gerit hæderæ similes.

Marē & foeminā quidā faciūt, multū inter se  
differētes. Nanq; materies maris dura, nodosa,  
rufior & odoratior, cortex quoque crassior, &  
detractus inflexilis. nec semē fert aut florē vt  
foemina: quæ crassior est arbore, materia quoq;



cādida. Mōtibꝫ aquosis gaudet, ex cuius cortice, infantium cunæ fiūt, & cistæ: leuissima est enim huiusmodi materia, vnde Virgilius secūdo georgicon tiliās leues appellauit. Fiunt & è ligno tiliaceo capsæ & arculæ, vnde Columella lib. 12. arculas tiliaceas laudauit.

Sed & tilia minus late si fumatur, pro tunicis tenuissimis accipitur, quæ inter lignū & corticem multiplici membrana inueniuntur, è quibus etiam vincula tiliæ vocātur. Vnde per trāslationē Plinius corticis interiores tiliās in vīmo dixit pro huiusmodi membranulis. Philyras quoqꝫ (siue mauis Philuras) pro tenuissimo earum membranarū corio siue libro sumpsit idem author, in quo solebant antiqui scribere, vnde ait Martialis, libros in philyræ cortice subnotatos. Quin & ex philyris necēbātur coronæ apud antiquos: quoniam flexiles & decoræ essent: hinc Horati⁹ ait sibi displicere nexas philyra coronas. Atqꝫ hæc de Tilia satis.

A C E R vulgo *erable*. Arbor est tiliæ nō ab similes, forma & magnitudine, verum cortice paulo scabriore subliuidóqꝫ, crasso, & ad flectēdum contumaci: radicibus paucis, sublimibus, crispis: materie venis longioribus fluctuante, molli, macilēta, gracili, ex qua fiūt arcus apud nos. In riguis potissimum nascitur. Plinius author est in hac arbore duo tubera reperiri: vnū brusci nomine, alterum molusci: illud intorti⁹ crispum: hoc simplicius sparsum.

Aceris genera tria fecerunt græci: campestre, quod candidum aiunt esse, nec crispū: atq; id quidem γλαῖνον vocant: Montanum, crispū duriūsq;: Tertium genus zygiā vocant, fissili ligno, cortice liuido, & scabro, materie rubenti, ex qua iumentorum iuga fiebant, vnde nomen tractum. Quāquam nōnulli carpinum esse autument.

CARPINVS vulgo *charme* inter aceris genera enumeratur, quemadmodū mox dicebamus, atq; id est genus quod græci ζυγίαρ quasi iugalē vocarunt, quodd ex eius arboris materie τὰ ζυγὰ hoc est iuga iumentorum probe fierent: quanq; etiam manubria carpineā rusticis instrumentis apud antiquos fierent, inquit Plinius lib. 16. & Columella lib. 12. nostra autem Gallia carpinū Vulcano potius quā lautis operibus dicat.

Diuersum genus ab acere carpinum esse ait Theophrastus ex quorūdam opinione: refertq; Stagiritas hōc distinguere carpinum ab acere: quodd carpino flaua crispāq; materies sit, aceri cādida: intercurfantibus nervis scatens. vtraq; arbor ampla: platano in fingēdo similis. Cæterum carpinus cortice paulo scabriore quā ulia vestitur, subliuente, crasso, spissiore q̃ picea & inflecti contumace. Radices paucas mittit, sublimes, magnāq; ex parte crispas.

ALNVS, apud nos latinum nomē ferè retinet *aune*: vnde pumilas siue pusillas alnos, vulg.

gus nostrum vocat *aulneaulx*: arbor est flore  
& fructu sterilis, in aquosis nascēs, caudice re-  
cto, ligno medullāq; molli: folio pyri sed am-  
pliore, ac nervosiore, quadātenus orbiculato,  
virgatōq; cortice squaroso, foris albicante, in-  
tus rufo: radice summa, tenui, nec maiore q̃  
laurus. Materies eius ad naualia cōmendatur.  
vnde Virgilius primo Georgicon,  
Tunc alnos primum fluuij sensere cauatas.

BETULA, vulgo nota, Gręcis *semyda* dicta,  
nostris *boulean*, gallica est arbor (inquit Plini⁹)  
mirabili cādore, atq; tenuitate, terribilis magi-  
stratuū virgis, eadem circulis flexilis, item cor-  
bium sportis, & ligaturis vtilis. Cæterum folio  
est sagino, paulo angustiore, trunco enodi, cor-  
tice versicolore, materie læui, cādidißima, vir-  
gultorum eximia tenuitate: cortex ignem fa-  
cillime concipit, ideo rura lucernarū vice suc-  
cendūt, reddit flagrās pingue quoddā & oleo-  
sum. vsus apud nos baculis tantum & scopis.

FRAXINVS Gręcis *melia* vel *milea*, nostris  
*fresne*, arbor est in planis potissimū nascēs, pro-  
cera, caudice tereti, crassiuenio, nervoso, læui,  
enodi (quāq; triozos, hoc est, trinodia à Gręcis  
vocitata: sed ob id q̃ ramos habeat prægran-  
des, ordinatos, parēsque numero) corticem ha-  
bet læuē, spissum, tenuē, rubrum: ramos vtrin-  
q; pēnatos (inquit Plinius) hoc est per ampla ver-  
tuum interualla, tanq̃ per genicula cōtinentes  
vtrinque pendentes, perinde atque sorbus: Folia

gerit lauri latifolia, acutiora tamen, leuitérq; per ambitum serrata, quorum extremæ marginum fibræ, in molles spinulas occallescent, porracei coloris: semine est minuto, ipsis folijs incluso, amaro, radice multa, crassa & sublimi. Nostrâs fraxinus, magna ex parte flore caret, & fructu: verum multos à radice mittit fungos ganæ expetitos.

Fraxini duo genera fecerunt Græci, alterum excelsum, procerumq; ligno candido, molliore, crispiore, neruoso, enodi, cuius materia hodie optimæ hastæ fiunt, qua etiam ex materia hastam Achillis fuisse fabricatâ scribit Homerus. Eam fraxinum bumeliam in Macedonia nominât, perinde quasi polymeliam, id est ingentem fraxinum: Aeoles enim b pro p, litera, vt pro πολὺ expuncto, λ, elemento, β, ã, pronuntiant, nō bouem sed magnitudinem intelligentes. Alterum fraxini genus humilius fecerunt Græci, ligno scabriore, duriore, fuscio: folio lauri aculeato. Alij situ discreuere fraxini genera: câpestrê enim esse crispam, montanam spissam volunt. Sunt qui natalibus discriminent: montanam dicunt esse coloratior, robustam, læuem & lentam: campestram vero decolorem, raram, scabramq; assurgere. Vulgus vero nostrum campestram fraxinum, ornum appellant, *fresne champestre*. quemadmodum suo loco diximus. Quedâ autê arbor est apud nos fraxino aliquantum humilior, folio d. ij.

ferratiore, per ambitum hispidiore cætera fraxino similis: quæ certe fructifera fraxinus dici potest. Fert enim baccas ex rubro nigricantes, quibus per inopiam frugum annonæ rura nostra vescuntur.

**T A X V S** nostratibus sylvis satis frequens, Græcis smilax dicta, aliquibus milos, vulgo yf. Arbor est, abietis aspectu, sed humilior: fronde perpetua, aliisque frequentioribus sinuosa: folio pinguiore & molliore: baccis rufis, rotundis, mollibus, gustu non insuavi: radice brevi, gracili, per summa cespitum: cortex cedro per similis, tum scabritia, tum colore: quo detracto, totum subesse cor cernitur. Plutarchus tradit ymbra taxii dormientes enecare, cum irruens arcem sensus obsidet. Conglutinamenta siue subscudes ex ea scrinijs & subsellijs parantur: ex eius quoque materia apud nos arcus & scorpiones fiunt.

De salice, ulmo, populo, platano, & huiusmodi arboribus, quæ privatae potius sunt, quam sylvestres, in arbusto disseruimus. Dicamus iam de externis, quæ aliæ sunt à coniferis & resinaceis.

#### EXTERNAE.

**A D R A C H N E** (siue andrachnus cum Pausania) sylvestris est arbor, haudquam perca, neque in planis nascens: in Helicone monte frequentissima, similis ynedoni, folio tantum minore, nunquam in summo vertice deciduo, perpetuo enim cacumine viret: cortice nec scabro nec squaroso,

sed qui circumruptus videri possit, quo auulso præter aliarum arborum naturam non offenditur, nisi quis corpus vehementer presserit, germens, que futurum luxauerit. Materiam mulieres expectant ad opus telarum textoriumque. Caueto autem ne andrachnen pro adrachne legas aut proferas: est enim Andrachne portulaca, quemadmodum in Hortulo docuimus.

**A P H A R C A**, est sylvestri arborum genere, superiori similis: æterna quoque fronde viret: sed in totum cum adrachne, non nisi in summo perpetuum foliorum virore retineat: non nisi in motibus etiam nascitur: Olympo monte frequens: septis vallibusque utilis: vrendo quoque ut præcidat. Vtraque arbor, inter biferas traditur: primum fructum maturat, quum dulcescit vua, secundum cum appetit hyems.

**A R I A** quoque sylvestris arbor Theophrasto, hyemis initio fructificat, materie durissima: ut necesse sit antequam terebrete macerari prius aqua, quod & in robore carpinoque seruat. Honores ei ad carbones, argentariis, utique ad primam coctionem.

Est & Aria siue agria, quam pro ilice aquifolia Dores usurpant.

**C I T R V S** arbor est alia omnino ab ea quam in Seminario descripsimus, quæ citrea mala producit. Est enim hæc citrus, sylvestri cupresso similis, caudice, folio, odoratis: multo in medicina vfu, præsertim eius cortex. Ea autem est arbor, cuius materia atque etiam radicibus antiqui mensas egregias (quas citrinas vocabant) & pedes lecto d. iij.

rum cōficiēbant. Vnde Seneca testis est in obiurganda temporū suorum luxuria, quōd citri radices insanis licitarētur pretijs, ad mensarū lectorūmq; ornamēta. De mēsis autē citrinis, tygrinis & pātherinis videto Pli. lib. 13. ca. 15.

TROGETES & Thuia siue Thuion aut Thya idem ferē arboris genus est, cū citro. ex ea enim celebres mensæ apud antiquos quoq; cōficiēbātur. Arbor est (vt īquit Theophrast<sup>9</sup>) perpetuo virens, procera, inter syluestres serotina: vt nulla ferē tardius germinet: argentissimis locis, & montiū cacuminibus gaudet, circa Iouis Ammonis delubrū præcipua, nascens in Cyrenensi agro: ramis, caudice, frōdib<sup>9</sup> syluestri cupressō similis. Ex ea refert idē author memoratas veterū templorū contignationes fuisse factas, quandāmq; immortalitatē huic inesse materiæ, in tectis cōtra omnia vitia incorruptæ. Nihil radice crispus, nec aliūde pretiosiora opera. Fert (vt quibusdam placet) in fructu nucleos hordei grano similes, lōgiore duntaxat, exiliores & duriores, gustu amaro, quibus præsumptis arceatur ebrietas.

COLYCEA arbor circa Idam puenit, alioqui rara inuētū, fruticosa, ramosāq;, & multis alis cōcaua: folio vlni, lōgiore, satis ad foliū latifoliae laurus accedēte, sed ampliusculo & rotūdiore, supra viridi, infra cano nervosōq;, præ tenuib<sup>9</sup> neruulis, fibrísq; de medio callo in costarū specie adductis: materie solida: cortice nō læui, & quasi vitigineo vestit: radicib<sup>9</sup> p sūma



gracilib<sup>9</sup> & solutis, cæterū fibratis & mirum in modum flauis. Sterilis, & flore vidua. Surculos tamen circa folia pingues, læues, candidos, armetacea facie fundit. Præcisa, vel ignibus exusta, ab imis rediuiua resurgit.

Est & alia apud Theophrastū noīs eiusedē, folio salicis, comosa, ramosa, in totūmq; ampla, valuulis leguminū more nō angustis, in quib<sup>9</sup> semē latū, parū, durū, nō tamē nimis, nec abūde, p magnitudinis ratiōe fructificat. Sed ppauca & inuētū rare arbores quæ siliquētur. Hæc Plinio staphylodēdrū dici existimāt, arborētrās Alpes simillimā aceri, albā in materia, ferentē siliquas, & in ijs nucleos sapore nucis auellanæ.

De Colutea in Fruteto dicem<sup>9</sup>. nanq; frutex est, quadriēnio se in arborem efferens.

**L A B V R N V M**, arbor alpina, nec (inquit Plinius) vulgo nota, dura & cādida materie, cuius florē cubitali longitudine, apes non attingunt: odit aquas, nec nisi in siccis prouenit.

**I O V I S** barba, etiā arbor est in siccis tātū nascēs, & aquas horrēs, sed opere topiario tōsilis, & in rotūditatē spissa, folio argēteo. Hanc esse nōnulli cōtēdūt, quā Theophrast<sup>9</sup> Diosporō, id est semen Iouis appellat. Arbor extat Parisijs in peristylīo sacrarū ēdiū diuæ Genouefæ, in orbē tōsili venustate comās, ramis in rotūditatē expatiātib<sup>9</sup>: pomo cerasi, rubro, osse int<sup>9</sup> præduro. an tamē diosporos fuerit, asserere nō ausim, cū pauca admodum de ea sint prodita, quibus facile colligi possit diosporon esse.

**CASIA** fistularis siue fistulacea Græcis recētiorib⁹ casia syringodes appellata (nā antiqui Græci, ei⁹ nō meminerūt) Actuario nigra casia dicta, alijs Indica cāna: Arbor est magna, partim in India, partim in Aegypto nascēs, & etiā hodie in Asia frequēs: Iuglādis folio: fructū ferens oblōgū, teretē, duūm ferē pedū p̄ceritate, qui dū vento agitat, vt cānæ sibi inuicē occurrāt, magnū edit strepitū. Actuari⁹ casia fructū ita nobis reddidit. Fructus est oblongus, teres, cōcretū intus atramentū cōtinēs, nō vna coalescens serie: sed ex interuallis lignosis tenuibusq; membranis septum. immersis ossibus seminarijs. specie & figura non absimilis ijs quę cognita nobis siliqua profert, de qua siliqua in Seminario diximus.

**ANACARDVM** recētiori græciæ cognitū (eius enim antiqui Græci nō meminerūt) Arbor est Indis familiaris: puenit quoq; in Sicilię montibus, qui flammās ignis eructant, fructu auiculæ corculo non dissimili, vnde nomen putatur inditum: rubēte intus cruore, quo veluti sanguine scatet.

**Orneoglossum** (linguam auis officinę nomināt) Arbor est vlmī specie, folijs amygdalę, prælongis siliquis in furculorū cacumine prodeūtib⁹, oleagina magnitudine, in quibus medulla inest linguę auis similis (vnde nomē) exteri⁹ rubra, intus ex cādore in luteū vergēs, sapore acri, vellicāte linguā cū nōnulla amaritudine.

Ebenū, Gaiacū & Bersilicū hoc loco longiori sermone connumerarem, nisi essent nobis vel quauis descriptione penitus ignotæ arbores: tantum enim ligno & materie (quæ nobis est vsui) vnā ab alia discernimus, vt Ebenum dicamus, quod lignum nigrum apparet. vulgus nostrum vocat, *de lebene*, Gaiacum quod albū, intus tamen pullitiem ostētat in fuscum degenerātem. vulgus nostrum vocat, *du bois de Gaiac*. Bersilicū quod materie est ex purpura rubescente. vulgus vocat, *du brasil*. Hæc ad nos ex India, ac potissimum ex nouiter repertis insulis magno aduehentium quæstu veniūt. Ebeno utimur in operibus vermiculatis, itē ad statuarum elegantiam, quas nolumus carie aut vetustate infici, præterea ad medicinam. Gaiacum notū est (vel mulierculis) quo sit in vsu. Bersilicū, imbuēdis velleribus magnopere expetitur, vnde ex eo ligno infectores magnū quæstum faciunt, quapropter multis nūmis venit.

Piperis arborem hoc etiam loco describeremus, nisi parum apud recētiores atq; adeo veteres ipsos conueniret, quænam esse dici debeat. Itaque in tanta variarum sententiarum cōtrouersia, ad Ruellium vos relegabo: ex cuius vigilijs doctissimis, quæ hic breuiter tantum explicauimus, longius & multo vberius atque eruditius descripta accipietis. Iā enim ad Frutetum festinandū est, antequam herbas in syluis passim succrescentes describamus.

# Frutetum.

Frutex quid sit, in Seminario descripsimus. Frutetum autem appellabimus hoc loco, non quidem locū fruticibus amœnitatis causa con-  
situm, (quanquam etiam id significare potest) sed soli tractum præsertim circa montes, aut ad occasum, in quo nō nisi frutices sponte cre-  
scant, vel etiam herbæ fruticantes: præterea ni-  
hil ibi feri aut nasci possit: vulgus nostrum vo-  
cat *boccaige*. Huiusmodi fruteta videbis plerū-  
que post nemora, & sylvas grandiores: maxi-  
me sabuloso solo, in quo maiores arbores in-  
crementum capere non possunt, aut alius ra-  
dices agere. Melius (inquit Columella) nemori-  
bus herbidis, & frutetis, & carectis, quàm lapi-  
dosis locis duratur vngulæ. Vnde frutetosum  
locum vocat Plinius, huiusmodi frutetis admo-  
dum frequentem: sunt enim quædam arida lo-  
ca, in quibus sponte soli, nihil vberius aut foeli-  
cius proueniat quàm frutices. Siccis (inquit)  
hæc, sabulosis locis, frutetosissq; nascuntur, *lieu*  
*boccaigeux*. Columella, Nemorosi frutetosique  
tractus, duplex cura est. Agedum explicemus  
iam in nostro hoc fruteto, quicquid fruticum  
in huiusmodi tractibus, tum apud nos, tum a-  
pud exteros conspici solet: & à nostratibus in-  
cipiamus.

20 NOSTRATES FRVTICES,  
AVT HERBAE FRVTICAN  
TES.

Sparton siue spartion, aut lygon, frutex est in Hispania & Africa præcipue nascens, ad nauium funes, & calathiscos: leuceam vel lygeam vocat Athenæus. virgas emittit lōgas, sine folijs, validas atque lētas, vinculorum vsu præcipuas. Florem fert luteum, similem ei violæ quæ alba dicitur falso, vulgo keyri. Folliculos fert phasiolorum modo, & in his semen lenticulæ.

Genista autem quæ nostris vulgo dicitur, *de la geneste, ou du genest*, non est eadē cum sparto. in hoc enim differt, quòd virgas non emittat adeo longas aut flexiles, sed magis asperas & minus rotūdas ac iunceas. dicta genista (inquit Ruellius) vel quòd genibus medeatur dolentibus, vel quia genu modo sit flexilis.

Erice, quibusdam tamariscus, is est frutex Dioscoridi, qui vulgo appellatur *des bruyeres*, colore & folio pene rorisinarini (inquit Plinius) cuius flore vescuntur apes posteaquā æstate germinat, vnde mel ericeum antiquis appellatum.

Myrice siue Tamarix, frutex est, ramos salignis similes habēs, siue scopis amerinis: cuius radice vasa antiquis fiebant, in quibus qui lenis affectu laborabant, solebāt bibere. folio est angusto, carnosio, & ferè pinnato. Cæterū om

nino sterilis . vulgus nostrum vocat tamarindorum, satis barbare.

Alia est myrice fructifera, quæ in Achaia procerissimas æquat arbores, ramis ex herbaceo fuluóque variegatis: lignoso fructu, maiore quàm galla: in quo semen gustu asperum, eiusdem effectus cuius etiam galla.

Ruscus, qui oxymyr sine dicitur, in arbusto descriptus est quando myrtetum explicauim⁹, est enim profecto sylvestris myrtus.

Rhus Græcis, Theodoro fluida, Latinis & Plinio, frutex excoriarius, quoddam eius folium corijs spissandis sit vtile, vulgo *sumach*. Arbuscula est in petrosis nascens duorum cubitorum altitudine. Virgas fundit breues & graciles, folio vlni, longiore paulò, subhirsutóque, disposito per versus, ita vt in nouellis ramorum, contrarijs inter se pediculis germina respódeant: ijs candidas pelles inficiunt. Flos in racemis candidus, à quo semen collectum, lentis & terbinthi similitudine, rubescens cum vua, id vero semen vocatur etiam rhus & erythros, medicamenti necessarium: aspergiturque obsonijs salis loco, in eoque osseum. Radix simplex per summa cespitum cohærens, vt facile possit vniuersa velli. Nascitur vbique, sed in argillofis potissimum.

Est etiam sylvestris herba rhus appellata (inquit Plinius) folijs myrti coliculis breuib⁹, quæ tineas & venena pellit.

In montibus & petrosis apud nos frutex inuenitur fructuarius, ramulis digitali crassitudine, bicubitalibus, folijs vlmeis, pilosioribus, quæ paribus internodijs aduersis pediculis coniugatim adhærent, per ambitum minutissime serrata. Flos albus racematim enascitur, eoque marcescente acini ostenduntur in vnam congesti, grano lentis magnitudine, latiusculo, & veluti leuiter vtrinque compresso, cum ematuruit rubro, radice per summa cespitum vagante, rura nostra *viurnam* appellant, flexu ferè inuictam, & ob id fascibus ligandis vtilem. Sed folia & frutex incano ferè colore nitent, ruborem tantum procidentia præferunt. Nisi hoc fuerit genus, extrita vna litera, viburni nomen fateretur: de quo Virgilius cecinit,  
 Quantum lenta solent inter viburna cupressi.

EVONYMOS quibusdam, alijs anonyms, quasi à nō habēdo nomine, putatur esse ea quā nos vulgovocamus *du fusain*. Nā huic multæ deliniationes fauent, cū ea quā antiqui descripserunt, in Lesbo insula frequēti. Est igitur talis nostratis fruticis descriptio ex Ruellio. nā illinc malo desumere, quā vel nouam temere confingere, vel doctissimi viri laborē tacendo e mentiri. Arbuscula est in montibus, & interdum viuvis sepibus nascens, punicæ mali proceritate, folio maiore, satis ad laureum accedente: flore luteo, albæ violæ non dissimili: siliquis quadrangulis, per maturitatem purpureis: gra



no intus solido, coccata mēbrana clauso. Frustex grauitē, cum delibatur, olet. hunc neque pecus neq; capra nouellorum etiam germinū auida, prorsus attingit, ligno intus buxēo, quod ad fusos netu muliebri celebres vsurpant: inde *fusariam* vel *fusanum* rura vocant. Siliquas vulgus *scrota* nominant *sacerdotum*, q̄ intus erui magnitudine grana, mollibus inuoluta mēbranis testiculorū modo cōtineātur. Culinæ trāsfigendis lardo carnibus pro veruculo frequēter vtūtur. Sed an sit euonymos (et si multę deliniationes faueant) non ausim affirmare.

Anagyris, à tetro odore dicta (vnde pueri biū grēcū, apud nos quoq; celebratū, ἀνάγριον *nivēp*, anagyrim mouere. in eos iactari solitum qui obfutura sibi commouent) sunt qui nauteam à Plauto vocari putent, in Asinaria, sed auctorem non habent (nauteam vero herbam esse grauē scribit Festus, qua coriarij vtantur: à naui dictam, quasi nauseam) à quibusdam aconitū dicitur, recentioribus malua terrestris: q̄ humi, maluæ modo iaceat: rusticis nostris, lignum putidum *du boys puant*. Arboris instar fruticat, folijs & ramis salicis amerinæ: foedo odore, flore brassicæ, siliqua terete, in qua semē continetur renibus simile, cum messibus matu rescens. folia trita, atque adeo lignum recēter delibratum mire foetent.

Ligustrum, Buxum, Iuniperū, Cedrū, in Hortulo requirito. Nam eos frutices illic ad orna-

tum confeuimus . Periclymenon autē vnà cū clymeno postea in Monticulo describetur.

Quæ Dioscoridi & Galeno Ptarmice, à cien do sternutamēto dicta est arbuscula: quidā eā esse putant, quā vulgus nostrū vocat syluestre pyrethrum, & gustum pyrethri modo ( quanq̃ mitius ) vellicet. Dioscoridis descriptio in prōptu est: nostratis autē fruticis, sic habet ex Ruellio: Ptarmice apud nos fruticulus est aut herba fruticās, haud ferè cubito altior: surculis teretibus, paruis, abrotono nō dissimilibus, geniculatis, lente rufescētibus, qui folijs olea lōgiōribus & copiosis ambiātur, angustis, vtrinq; leniter serratis. Cacumen opacat capitulū, flores gerens anthemidis seu chamæmeli atq; id cacumē in orbē radiatū est, ac suo acri odore nares feriens sternutamentū irritat. Inuenitur sæpius in montibus & saxosis, locisq; quibus tofus subest.

Pyrethron autem quam Romani saliuarem vocāt (quodd radix eius ori admota saliuā insigniter creat) nostris est hodie ignota, præterq̃ radice, quā officinæ pyrethron vocant, vulgus pedem Alexādrinū: ea vero digitalis est crassitudinis, oblonga, gustu feruenti. Cæterum ipsa planta ex Dioscoride folia gerit gallicæ pastinacæ, aut fœniculi, caput anethi orbiculatum, in orbe nostro noni visitur.

Solanum soporiferum, quod græci strychnō hypnoticū vocāt, hic adscribem⁹ inter fruticū

genera : æquam rupibus non longe à mari inueniatur . vnde herbarij nostri solatrū marinū & dormitorium vulgo vocāt. Fingamus igitur hic nostrum frutetum non longe abesse à mari : id enim nobis facile licet per hypothesim . Fruticat hoc solanū multis ramis, densis, lignosis, frangi contumacibus, dense comatis, folio pingui , cotoneimali similitudine : flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice longa, subrubro cortice vestita.

Quod vero solanum soporiferum à nostris herbarijs ostenditur: sic se habet ex Ruellij descriptione. Folio est iuglandis, caule scipionis crassitudine, procero, grandibus ramis brachiato, flore inferius herbaceo, labris superne purpureis: bacca primum viridi, loculosa, per maturitatem nigra, quæ dehiscens, vel sponte diffiliens , ostendit acinosum semen , vix modo aceruatim collectū , quinis myrti foliolis stellatim decussatis, baccam fulcientibus.

Strychnon manicum, latinis solanum insanum vel herba insaniosa, vulgo solatrum mortale, inuenitur etiam in montibus vento perflatis , maritimis foueis & vagis. folijs est crucæ maioribus, caulib<sup>9</sup> proceris, vlnarum quatuor longitudine, capitulo in cacumine oliua maiore, vt platani pilula: hirsute flore, nigro, quo excusso racemus emicat rotundus, denis duodenisve acinis constans: similibus hederæ corymbis, vt vix, mollibus: radice candida, crassa, ca-

ua, cubitali. Eam esse quidam putant, quam antiqui doryon siue dorycnion appellabant: quoniam cuspides in prælijs eius folio tingerentur: tum enim passim crescebat.

Dorycnion autē, aut caleam ex Crateiē scriptis, aliud esse existimauit Dioscorides à solo manico. appellauit enim fruticē oleæ recē enatē, quē modo surrexit in vimen proximū, ramos habentē cubitalibus minores, in saxis nō pcul à mari puenientē, folijs oliuæ minorib⁹, cōcoloribus, minusculis, præter modū scabris, flore candido, folliculis in cacuminib⁹ ciceris, dēsis, quinis intus aut senis granis, erui magnitudine, rotūdis, læuibus, robustis, versicolorib⁹. radici crassitudo quæ digiti, lōgitudo q̄ cubiti. Somnifera huic natura, largioriq; mortifera.

Cisthos, quā aliqui citharon aut cissaron nomināt: recētiore rosaginem, siue rosam caninam, frutex est in saxis emicans, ramosus, frondosus, nec præaltus: folio circinnatæ rotunditatis, hirsuto, acerbo. duo eius genera, flos masculo rosaceus, fœminæ albet.

Sub cistho ad radices, nascitur hypocisthis, quibusdam orobethron dicta, malo granato immaturo similis.

Est & aliud Cisthi ladaniferæ gen⁹, à quibusdā ledū vel lada vocatū: frutex ab altero nō abhorres: nigriorib⁹ tantū & lōgiorib⁹ folijs, quē vero tēpore quippiā pingue, rosidū contrahūt, ex quo ladanū elicitur, quo ī odoramentis vtimur.

Eius autē extrahēdi rationē duplicē refert Dioscorides, vel dū hirci aut capellę barbis insidet, carpētibus cisthi folia: vel dum attractus funiculis rapitur. succulentique funes depectuntur, & in offas ladanum cogitur. Sed vereor ne hæc longior mora, sit præter institutum.

Colutea, magni Alexandri ætate, non temere alibi q̃ in Lipara nascebat: iā tamē in Gallia puenit, oībus nota *baguenaude*, frutex est, q̃driēnio se in arborē efferēs, ramis exilib⁹, folio fœnogræci, mēbraneo folliculo, pellucēte, p̃tundido, & veluti quodā spiritu distēdēte, turgido: ita ṽt digitis si p̃matur, crepitās dissiliat, in quo semen atrū, durū, latū, lētis magnitudine, pisi gustu. Mauritanī sermone suo vernaculo *sene*, nomināt: duóq; ei⁹ faciūt genera: suę sp̃tis, et hortēse: nā et semine nascit in fimo p̃cipuē ouillo.

Halimos gr̃cis, hoc est famē sedās, q̃ ei⁹ folia vesca sint & famē ipso esu cōpescāt. Latini (inquit Plini⁹) aureonē vocāt, vulgus nostrū *blanche putain*. frutex est in sepib⁹ & maritimis nascēs, rhāno similis, sepimēto vallari idone⁹, sine spinis, folijs oleę, dūtaxat laxiorib⁹, cortice candido: recta ascēdit, crassitudine brachiali. Hui⁹ folia instar oleris decocta cibo sunt optima.

Chamælea, item etiam Thymelæa, etsi syluestrium fruticum generis sint, tamen quia ad oleam vocabulum item etiam descriptio spectare visa est, in Seminario atq; adeo Oliueto nostro descripsimus.

## EXTERNI FRUTICES.

**FERVLAM** Hippocrates plestinga vocauit, vnde nō minus à feruēdo q̄ ferēdo dictam existimarūt nōnulli: græcis ferē omnib⁹ appellatur narthex: adscribitur fruticū generi, quoniam teneritudo eius, p̄cessū trāsit in lignū: vnde Clearchus in scirpis suis, hoc est, lusorijs quæstionibus, ferulam dicit esse lignum non lignū. Calidis locis nascitur, & trans maria, plurimum Africæ cognita, atq; adeo Aegypto. me mini autem me vidisse etiam apud Italos. Caulē habet fœniculo non dissimilem, sed multo altiorem, & magis striatum: vt potius ad cicutæ formam degeneret. intus autem præditum est fungosa quadā medulla vt sambuci: interdum caulem inanem habet veluti arundines. geniculatīsq; per vices notatur scapis. A genibus folia exeunt grādia, mollia, multifida, maxima, terræ proxima, caulem amplectentia, vt arundines: sed magis scinditur in coliculos, quibus flores lutei, semen anethi. Nulli fruticum leuitas maior, ob id gestata facilius baculorum vsum senectuti præbet: hinc etiam antiquorum ludi magistrorum sceptrā, ad pueros terrendos aut etiam interdum afficiendos, fiebant è ferula, nam à feriendo ferulam dictam esse quidam putant: vnde satyricus ille manum se ferulæ subduxisse ait, cū se non iam amplius discipulum: sed rude donatum innuit. Duo ferulæ genera reddidit Theophrast⁹: nar

theca vocat adfurgentem recte: nartheciā semper humilē, quæ ab aliquibus ferulago dicitur.

Ferulago autē, vel ferula sylvestris, pfecto ea est quā nos Thapsiā vocam⁹, q̄ in Thapso insula primū inuēta fuerit. Est enī in totū ferulę natura, caule tamen graciliore, & inani, neq̄ baculi lōgitudinē excedēte, fœniculi folijs: ī cacumine singulis ramulis, vmbellas anetho similes ferēs, & sup eas luteos flores, semē latiusculū, quale in ferula, dūtaxat exilius: vnde non nulli Thapsiā vocauerūt ferulę semē. radicem habet magnā, interius candidā: nigro cortice: quæ incisa (vt inquit Plinius) lacte manat.

Cæterū frutex est quidā ferulace⁹ in Media nascēs, lachrymā & succū fundēs sagapenū antiquis siue sagapenion appellatū: officinis nostris interpollato nomine serapinum. laudatur foris trāslucidum, colore ruffo, & cū frangitur, intus candido: odore medio inter laserpitij succum & galbanum, gustu acri.

Est & in Africa pxime Hāmonis Iouis delubrū, frutex ferulaceus, qui totus cū radice sua agasyllis nominatur: è quo destillat succus resinosus, quē nostri hodie hāmoniacū vocāt, gōme ammoniac. Dioscoridi Hāmoniacū etiā ipse frutex dicitur. Sūt qui hāmoniacū thymiaa vocare malint: Romani guttā appellāt. probatur maxime coloratū, nō lignosum, sine arenis, ad thuris masculi similitudinē cartilaginosum, purū, prædensum, liberum sordibus, odore casto



rei, gustu amaro, quod gen<sup>9</sup> dicitur thrausma.

Silphion quoq; gręcis, latinis laserpitiū & lafer, frutex est apud Cyrenēses p̄cipue nascens, annuo caule, altitudine & crassitudine quasi ferulę, folijs apio similibus, quę incūte vere p̄siliunt, deciduāq; sūt, semine foliato, quale est isatidis satiuę, lato quidē: radice crassa, multāq; iucundissimi odoris. Succus duplex ex ipso frutice fluit. Nā qui ē scapo modice inciso destillat, appellatur opos cyrenaicos gręcis, latinis succus Cyrenaicus: nostris asa odorata, vulgo *ben iuyn*. qui autē ē radice fluit, lacteus est, vilior, & putrescēs, ac male olēs, vnde officinis assa fōrti da dicitur. Est & succus Ponticus & Medicus, atq; adeo Syriacus, & Assyrius, pro diuersis regionibus appellatus: sed opos vocabulo intelligitur Cyrenaicus, succus silphij.

Gallicum Silphium, siue laserpitiū vult appellari Ruellius, eā herbā quę frequēs in Germania visitur, & hodie interdū apud nos ī quibusdā hortis: angelicā vocāt vulgo, siue herbā aut radicē sancti spiritus, alij impatoriā. satis aut cū antiquorum laserpitio conuenit, vt ex Ruellij descriptione videtis.

Describēdę sunt hoc loco nardi fruticis differentię, & varię eius tum nomenclaturę tum etiam controuersię: ex nostro Ruellio doctissimo, breuiter collectę.

**NARDVM** indicū, frutex est graui & crassa radice, sed breui ac nigra, fragiliq;, quī p̄gūi,  
c. iij.

fitum redolente vt cyperi: aspero sapore, folio paruo densóq;: Cacumina in aristas se spargūt, ideo gemina dote, nardi spicas & folia celebrāt: Indicum appellatum, quod pars mōtis in quo legitur Indiam spectet.

Nardū Syriacū dictū, q̃ pars eiusdē mōtis in quo metitur, vergat in Syriā: nō autē q̃ in Syria crescat. melius est Indico, leuius, comosum, colore rufo, odore vehementer iucundo, cyperumque imitante, breui spica, sapore amaro, maximēque siccante os. custodit suaueolentiam pertinaciter.

Nardū gangicū vocat Flavius Arianus, aut gangeticū, alterū nardi Indici genus, qđ apud gangem fluuiū nascitur, qui montē in quo p̃sistit huiusmodi frutex, ambitioso lapsu p̃fluit, inde gangetidis nomen. Languidū est viribus, & quod vliginoso solo proueniat. Syriaco procerius adolefcit, pluribus ab vna radice fruticantibus aristis, vnā cōplicitis & virus olentibus, ob id etiam ozenitis appellatum, à graui nariū foetore deducto nomine, nempe quia huiusmodi nardi genus virulentum spiret odorem.

Inuentam in Thracia nuper herbam Plinius refert, cuius folia nihil ab Indico nardo dissentiant. Radiculas etiā quasdam odore nardum imitari testatur.

Nardum Samphariticum, gentilitium natalis vnde carpitur soli nomen retinens, pumilo sanē q̃ frutice, spicis ingētibus, candido caule,

in multos ramos brachiato, quorū cacumina p  
floris exortū in prælōgas exeunt spicas, caulis  
qui in medio (vt diximus) prorumpit, hircinū  
virus spirat: quapropter hoc nardi genus in to  
tum reijcitur.

Nardum Celticum vocant græci, quod alij  
Gallicum appellant, quia in Ligurię montibus  
item Istria & Gallia (quæ comata dicitur) cir  
ca montem Apenninum, præterea in Pan  
nonia nascatur, post Syriacum laudatur in or  
be nostro, quippe quod Syriaco leuius sit. Pus  
sillus frutex est, qui cum radice vellitur, & in  
manuales fasciculos digeritur: folia ei longi  
uscula, flauescencia, flos luteus.

Saliunca, nihil esse debet controuersię quin  
nardus Celtica sit, vel ex Plinij descriptione,  
quam cum Dioscoride collatam & eleganter  
discussam, videto apud Ruellium. Foliosā qui  
dem est, sed brevis, & quænecti non possit: ra  
dici numerosæ cohæret. Herba verius quàm  
frutex: densa veluti manu pressa, breuitérque  
cespes sui generis dicetur (ait Plinius) vnde eti  
am illud Virgilij in Bucolicis,  
Puniceis humilis cedit Saliunca rosetis.

Cum Gallico nardo semper nascitur herba  
quę hirculus vocatur, ab odoris grauitate, & si  
militudine quam habet cū nardo: nam ea her  
ba sepiissime nardus adulteratur. Vt autem dif  
ferentiam agnoscas: hęc à nardo distat quòd  
sine cauliculo est, & cādidior, minoribus folijs:

c. iiii.



quódq; radice sit neq; amara, neque odorata: quare distinctio perquam facilis habetur.

Nardū montanum, gręci nardū oreā vocāt, alij tylacitin, quoniā coriaceis sacculis ad nos aduehebatur. alij nerin appellant: Galenus etiā pyritin. Nascitur in Syria & Cilicia: ramulis & folio eryngij, minoribus tātum, neq; scabris & aculeatis, sine caule, sine flore, sine semine: radice nigra, duobus aut pluribus hastulæ regiæ bulbis, gracilioribus, minoribúsq; multo, suauiter olētibus. eiusdem est naturæ cuius & nardum Gallicum.

Nardum syluestre quibusdā appellatur herba vulgo nota, quam asarum gręci, nostri bacaram vulgo vel cabaram appellant *du cabaret*, ob id tantum quòd nardi vim habeat. Sed de asaro in Hortulo diximus.

Pseudonardum, falsa quadā nardi imitatio, ne nomen sibi sumpsit: ubiq; nascens fruticat apud nos, præsertim mōtuosis locis, folio crasso, flore, carnosio, angusto, colore lāguido in cādīs dū vergēte, frequentibus spicis in aristas sparsis, flosculis purpureis. Gaudet apricis & petrosis, tanta suauitatis fragrantia, vt omnes flores odoris iucunditate prouocet, qua dote vestibis inseritur. Duūm cernitur generū, vnū procerius adolescit, & maiorem spirat odorē: quod quia nō minus q̃ nardum placet, sibi spicæ nomen apud nos arrogauit, vulgus *aspicum* appellat. Alterū tum amplitudine, tum odore

minus: quod quia balneis, & hominū lauacris expetitur, elotāq; omnia, si permisceatur, odoris suauitate commendet, *lauanda* vulgo vel *lauandula* cœpit nominari, cæterum simillima. Vtraq; ppetua coma canescit, exitu veris Iunio & Iulio mense spicatur, tū cacumina manipulis latim in scopas cōponuntur, & aliquantū in solata siccantur ad varios odorum vsus. Vtroq; Narbonēsis prouincia (quantū audio) scatet, & montes & campi vestiuntur. In reliqua Gallia, in vinetis & hortis feritur, tum auulso ramo, tū viuiradice. Itaq; plurimū falluntur qui Symphariticum nardum & Gallicum siue celesticum pro pseudonardo, falso vsurpant.

Est porro in Indiæ paludibus cōchilij genus, quod circa eam regionem quæ potissimū nardifera est inuenitur, nardiq; fruticem inibi pascitur. quapropter eius conchilij operculū etiā nardum redolet, vnde eo in medicina & odoramentis vtimur, Græci id vocant onychem, nos vnguem odoratum à similitudine: id autē est eius formæ qualis in purpura visitur, vnde vulgo in officinis blatta bizantia appellatur, nomine à recētorib<sup>9</sup> medicis tracto, qui blattam purpuram indicam, & blatteum purpureum colorem appellarunt, nos vulgo *blauēu* vocamus, *du bleu*.

A M O M V M, Indicæ viticulæ genus est, è ligno se cōvoluens in vuē modū, odorato frutice, folijs bryoniæ quæ ex India importatur,

flore violæ candido. Falluntur qui amomū su-  
mant pro ea herba quā pedem colūbinū vulgo  
vocant, cū sit alterū geranij genus. nec minus  
etiā hallucinantur qui pro rosa hiericontis su-  
mant, quæ quid sit in Hortulo explicauimus.

Cinamomum, frutice breui, represso atq; hu-  
mili nascitur, surculosq; duūm cubitorū alti-  
tudinē nō excedente, arido: folio origani: sicci-  
rate gaudet: cum viret, parum odoratum: steris-  
lescēs imbre, nascitur in Aethiopia Troglody-  
tis p̄xima, & ad Caucasi radices, quā mare rus-  
sum spectat. Corticem itaq; fruticis, cinamo-  
mum appellamus, vulgus cānellā, *de la canelle*,  
quod tubos & canales imitetur.

Cardamomum, frutex est amomo nō dissi-  
milis, odoratus, oblongo semine & anguloso,  
quod ex Arabia & Media atque India ad nos  
defertur, id autē vocam⁹ granū paradisi, *graine  
de paradis*. Itali melligretam appellant.

Cardamomū Mauritanum, vel Cordumenū:  
frutex cōsurgit cubitalis, caule quadrangulo,  
à lateribus leniter striato, prodeuntibus geni-  
culatim & surculis & frondibus, hortensi sola-  
no nō dissimilibus: flore luteo: dependētibus ab  
alarū sinu rosarum alabastris, crassiore pedicu-  
lo nixis, in mucronē sensim turbinatis, p̄ initia  
virentibus, in maturitate quāruberrimis, ve-  
rustate puniceis: cute læui, relucente, quæ dehi-  
scēs aut aperta, semina ostēdit candida, lentis  
similitudine, in vix modum cōuoluta, quæ vel

per se, vel cum valuulis gustata linguam adeo vellicant, vt os etiam totum igneo feruore sentiatur deflagrare, tãta inest vtriq; comburendi licentia. Grana cum deglubuntur callum demonstrant pinguem, odoratum, gustu cū quadam astringentia mordaci, quod iã apud nos satum, hac quã repræsentauimus forma prouenisse testamur, p̃ multis apud nos locis. Vocarunt autẽ quidam vulgo *des merueilles*. Cætera Cardamomi genera ac differentias habeto ex Ruellio, nam longior sim si quidem omnia perscrutari studeam.

CASSIA odorata, quæ vulgo lignea dicitur, frutex est in Aethiopia nascens, vel in tractu Arabiæ odorifero: salicis amerinæ magnitudine, hoc est triũ cubitorũ, multis surculosisque brachiatus ramis, colore triplici variantibus pro arbusculæ incremento: quum enim pedali emicat mēsurā, candicat: mox addito semipede, rubescit, cætero nigrescit: folijs est piperis, angustis, odore rosaceo, crassiore quàm cinamomum sarmento, neruoso, tenuisque cute vel membrana verius q̃ cortice vestito. atque hic solus cortex cōmendatur: qui quoniam difficulter à materie seiungitur, qui hunc extrahūt bicubitales secant virgas, easq; præsuunt recētib; boum corijs, vt ijs putrescētibus vermīculi prodeant qui lignum erosuri excauent, intacto ob amaritudinem cortice. Ceteri pauca sunt de cassiæ differentijs dicenda.



Zegir appellata Casia Dioscoridi, genus est casia, aspectu purpure nigricatis, crassiore samento, rosam spirans, præcipui in medicina vsus. Ambigit noster Ruellius an id sit lignum quod ex nouo orbe, siue insulis nouis, ad nos quotidie adfertur, ex arborecente frutice, in nodos in flexo, scabioso: cortice facieq; lacunosa: materie dura crispâque: colore intus buceo, candido cingente orbiculo, quod prorsus olet rosas: ita ut scobem eius, vel etiam ramentum ligni, pro rosis, vestibis interponi fuerit gratissimum: nec odore cedit rosis, etiâ si decoquatur igni. Iam ex hoc, pectines depurgando capiti, ob odoris gratiam non insalubres fabricant: item alabaistros, pyxides, & cætera id genus.

Aliud habetur genus casia, ab indigenis achy vocatum, ab Alexandrinis mercatoribus daphnitis: rubescit hoc genus, estq; pulchri coloris: corali æmulum, foramine vehementer angusto. prælongus est frutex, crassus, fistulisque cõferëtus: mordaci gustu feruens, & linguam astringens, odoratum, vinum naribus obolens.

Daphnoides, mangonibus dicta casia, nescio an eadem sit cum superiore quam Daphnitim à mercatoribus vocari scribit Dioscorides: ea tenuissimis est surculis, lauri cortice. Serebatur olim in hoc orbe, extremo in margine imperij (inquit Ruellius) quâ Rhenus alluebat, viuebâtque in aluearijs apum sata: Color aberat ille torridus sole, ob id simul idem odor. ea apes

oblectabantur.

Blastos appellatur tertium casia genus : alijs germen moselyticum.

Asymphenon dicta casia, inter viles connumeratur. colore pullo, odore ingrato, prætenui tunica, quæ etiam vltro dehiscat, & abscedat à corpore: vt quæ citte, & darca dicuntur barbaris nominibus.

Lacta quæ barbaro vocabulo dicitur, casia est odoris mollissimi, gustu maxime feruēs, colore purpureo, quæq; plurima minimum ponderis facit: breui tunicarum fistula, nō fragili. huiusmodi dotes plurimum probat Plinius.

Balsamoides ab odore simili dicta, amara est, ideòq; medicis vtilior. Neq; multū abest Ruellius vt credat eā esse quā Dioscorides zegir, Galenus gizer, Aëtius ozen, vocarunt.

Casiam odoratam in Arabia meminit Strabo è stagnis colligi, non solum ex arboribus, quod facile conijcio propter frequētiam fruticum quorum cortex est casia: tanta enim est fortassis horum fruticum copia, vt per stagna cortices errabundi fluctuent, atque ita colligantur, nulla alia excorticandi fruticis diligentia adhibita.

Pseudocasia, casiam veram germana specie mentitur: eam autē subditiciam à legitima discernes, gustu neq; acri neque adorato, corticibusq; medullæ coherentibus.

Inuenitur & lata quædā fistula minimo pō-

dere, tenera, quæ alteri præferatur. Scabra reprobatur, tenuibus fistulis hircinum virus res dolentibus & squarosis.

Casia vero quæ fistularis dicitur, Græcis recentioribus sýringodes, Actuário nigra cassia (nam sunt qui duplici, s, scribant) ab aliquib<sup>9</sup>, calamos, id est arundo seu potius Indica canna, in superiori arborum externarum enumeratione descripta est. Nã inter arbores potius quàm inter frutices connumerari debet.

GLYCYRRHIZA, à radicis dulcedine nomen toto frutici inditum, vnde Celso plurimisque latinorum radix dulcis appellatur, Theophrasto Scythica radix, quodd & in Scythia frequens sit, circa Mæotim paludem, & hac radice contenti Scythæ, vitam interdum decem duodecimque dies degant: Palladius, glycyrrhidiā vocauit: adipos dicta Dioscoridi, quodd sitim sedet: officinis liquiritia: Gallis nostris *de la re clisse ou rigolisse*. Frutex est, ramos spargens binum cubitorum altitudine, folijs lentisci, aut buxi, aut sennæ, densis, pinguibus, tactuque gummosis, vtrinque pēnatis: caule herbaceo: flore hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudinis, asperiore tantum, & rubescentes lenticulæ valuulas referente: radicibus prælongis, buxæo colore, gentianæ modo flavescentibus, sapore dulci, quadantenus subacerbo, quæ lycij modo curatæ coguntur in succum.

CARYOPHYLLON quasi nucifolium

existimauit vocandum Paulus Aegineta (nam Dioscorides aut Galenus nullā fecerunt eius mentionem) frutex est sabuci forma, semine grano piperis simili, grandiori tamē fragiliorique, ex atro rufescente, in clauī modum capitato, exertis in aduersum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus, prominulo apice, quadrati alueoli sinu medio vmbiculatim prodeunte: à qua facie clauata Francis sibi nomē clauī caryophyllum adoptauit. Non desunt, qui caryophyllum repræsentent buxi caudice, lauri folio, sed rotundiore.

**BALSAMVM** (quantū colligere ex diuersis authoribus potuimus) frutex est proxime Aegyptum nascens, in regione quæ nūc Fons solis nominatur, quondam Heliopolis, in Arabia quoque, Sabæorum tractu maritimo, item in Iudæa circa oppidum Hiericho. Eius autem forma est viti quàm myrto similior, quidam etiam terebintho similem faciunt, rutæ folio, sed exalbido: alijs esse aiunt folio sampsuchi herbæ, coma perpetua, flosculo candidæ violæ, aut lycij, sarmentis ferè vitigineis, odore præstantibus, quæ quotannis interputantur, vixnearum more, & magno vaneunt. xylobalsum hodie & antiquis etiā dicebatur. Cū autē interputabatur frutex, succus tenuis à plaga manans diligenter colligebatur in cornua, qui succus hodie magno est in pretio apud nos: est enim suauitatis & pretij eximij, opobalsamum

vocamus. ex deinde succi guttæ in vase nouo fictili condebantur, crassiori similes oleo, & in musto candidæ rubescebant, ac subinde durescebant, è translucido. Vindemiam appellabāt succi colligendi tempus. cuius rationis plura videto apud Ruellium diligēter collecta. Fruticis discrimen in tria fastigia digeritur. primū scabro aspectu incuruū: secundū procerius cæteris, læui cortice: tertiū gracilius, tenui & capillacea coma: hoc vocāt theriston, ob id forsitan quod sua exilitate facilius demetatur.

**X Y L O N** quod aliqui gossipion nomināt, in superiore parte Aegypti quæ in Arabiam vergit nascens, frutex est exiguus, laniger, palmæ folio, similem barbatae nuci gerens fructū, cuius in exteriori bombyce, lanugo netur in linū cādidissimum molliissimūmq;, quod cottonum vulgo vocamus, vt lanuginē ipsam, *du cotton*. Frequens est hodie in Corsica insula tum frutex tum lanugo, vnde aduehentes Veneti non parū quæstū faciunt. Fiūt ex hac materia telæ quas xylinas appellare possumus, *toile de cotton ou boccaffin*. Gignitur etiā huiusmodi lanugo in quadā arbore, cuius folia ni minora essent, vitium planè poterant videri: cucurbitas fert mali cotonei amplitudine: quæ maturæ ostendunt lanuginis pilas, ex quib⁹ vestes pretioso linteo texunt. Theophrastus lanigeras quasdā Indiæ arbores describit mori folio, corpore autem cynorrhodi. sed hæc nihil ad xylon.

Therionarca inde nomen inuenit, quodd ser-  
pentibus torporē inferat: frutex est folijs sub,  
herbaceis, roseo flore. Plinio alia traditur, in  
nostro orbe nascens, fruticosa, subuiridibus fo-  
lijs, flore roseo.

Apocynon Galeno cynocrambe, aliquibus  
hypomanes, frutex est venenosus, longis viti-  
culis, male olentibus, lentis, folio hæderæ, mol-  
liore tamen, pinnatioreque, graui odore, glu-  
tinoso, & succo madente luteo. Valuulæ fili-  
quis fabarum persimiles, longitudine digiti,  
folliculosæ, in quibus semen durum, exiguum,  
nigricans.

Onagra siue onuris, vel oenothera, fruticat  
arboris instar. magnitudo quoq; ei iuxta, amy-  
gdalaceo folio, latiore, lilino non dissimili, flo-  
re roseo, grandi, radice candida, lōga, & cum  
siccata est, vinum olente, nascitur in mon-  
tanis.

Sed quādo iam de montibus sermo est, æquū  
est nunc vt absoluto quā breuissime fieri po-  
tuit fruteto, collem constituamus, in quo her-  
bæ syluaticæ post arbores & frutices ad extre-  
mum describantur, quemadmodum paulo an-  
tè sumus polliciti.

# Collis.

Arbores in sylua, frutices itē in fruteto descripsimus. Superest vt locū aliquē cōstituam<sup>9</sup> herbis syluaticis, & quæ (vt inquit Columella) in herbosis nemoribus succrescūt. Nā quæ syluæ sunt altiores & grandiores, cæ paucissimas herbas pducūt in ipsa soli area: aut quia terrenū nullā habet solis iucunditatē: aut quia crassissimæ arborū radices totū ipsum solū ambiāt, vt nihil vel minintis herbulis reliquāt, quo enutriripossint. In amoena autē sylua (quod nem<sup>9</sup> superius appellauimus) quæ plerūq; cædua est, & frequenter attondetur ad solis gratiam, certe permultas herbas inuenimus, tum ad arbores & frutices conscendentes, tum etiā humi serpentes, & toto solo errabundas: vel tūc maxime cū mōtuosum est nemus, aut ad orientē vergit. Itaq; collē cōstituere nobis licet in hac parte, & ob oculos pponere eū locū quē mox describebamus: in quo, post arborum & fruticū descriptionē, herbas etiam syluarū breuiter describamus. Incipiendum autem à filicō, in quo filicū species paucis enumerabim<sup>9</sup>.

## FILICTVM.

Filictum vocabimus soli tractū in colle aut monticulo, circa nemora, aut inter fruteta, vel etiā seorsim, filicib<sup>9</sup> omnis generis abundantē.



vulgus nostrū appellat *fugeraye*. Iam igitur filices omnium specierum describamus.

**FILIX** primū duorū est generū, mas & fœmina. marē appellabimus eā filicē quę Græcis pteris, siue pterion, vulgo osmunda regalis *os monde real*, sine flore est & sine semine, folijs tantū cubitalib⁹, ex vno artu porrectis & vtroque latere pinnatis, subgravi odore, radice per summa cespitū nigra, oblōga, multis capillamentis fibrata, subalstringēte gustu. nascitur in montibus & saxosis. Cōspicitur interdum filix mas vno caule, recto, duorū cubitorū alto, glabro, viridi admodū: è cui⁹ summo duę veluti folliculorū pinne assurgūt, breues, subcrassę, filicis formā retinētes: cæterū nūq̃ maiores. caulē si per mediū disseces in latū, deterso quodviscosi succi subinde erūpit, cōspicies deliniatā velutī aquilā expansis alis: qualis hodie depingitur.

*Thelypteris* Græcis, latinis filix fœmīa, vulgo *de la fugere*, alijs nymphæa pteris, pluribus ramulis fruticat, folijs pinnatis, quę nō singulari (vt superior) pediculo nitatur, radicibus lōgis, obliquis, ex nigro in luteū flauescētib⁹, aliquę etiam nū rubentes inueniūtur. Ea herba ignis beneficio in solidam materiā coacta fiunt hodie vitra apud nos, siue cyathi vitrei, quibus in poculis vtimur. quę vitra filigna siue cyathos filignos appellare nostris adolescentulis licebit, *uerres de fugere*.

*Dryopteris* in muscosis roborū vetustiorū  
f.ij.

partibus nascitur, filici mari similis, nisi quoddam minores habet incisuras, folia paulo crassiora, viridiora, & breuiora, radices habet sibi inuicem implicitas, hirsutas, astricto gustu, subdulces, quibus tusis, fit psilothron (inquit Dioscorides) vulgus nostrum appellat huiusmodi filicem, arboream osmundulam.

Filicastrum quidam appellat, alteram syderitidis speciem, filicem folijs referentem: nascitur autem precipue (quatum ipsi vidimus) eodem in loco quo superius descripta dryopteris: Lunariam maiorem vulgus nostrum vocat. folijs & alis filicem feminam omnino videtur imitari, binum cubitorum, ramulis exilibus, folijs utrinque diuisis, qualia filicis, pediculo longo, prodeuntibus ex alarum sinu surculis longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, in quo semine continetur quod betæ semine aliquanto rotundius est ac durius. Eo nonnulli mira nugatur posse fieri si quidem ea nocte colligatur quæ diui Ioannis festum præcedit: ipsamque herbam aiunt chymistæ quidam, noctibus cum luna lucere, unde lunariæ nomen inditum. Sed hæc Magis relinquamus, quibus etiam alia lunaria nocte gregon appellata, in gedrosia precipue nascens, visa est è longinquo noctibus lucere, unde nitilopa quibusdam dicta est.

Filiculam latini vocant quam Græci polypodium, à pediculorum multitudine, quasi multipedem, quæ eius herbæ radix multis cyrrhis veluti pedibus quibusdam innitatur. nascitur in vetustis petris,

rupibus, muris præcisis, & vetustis roborū caudicibus, palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, nō perinde tenui foliorū diuifura: quæ quidē folia parte auersa fuluis maculis notātur: sine semine est: radice hirsuta, crassitudine minimi digiti & acetabulis caua veluti quibusdā polyporum cirris, pilosa, coloris intus herbacei, gustu ex austero subdulci.

Dicamus iam de herbis fruticantib⁹ quæ arboribus syluaticis & fruticibus alligātur.

## HERBAE HERBORIBVS

### CIRCVNVLVTAE.

Clymenon, siue clymenos, herba à quodā rege sic dicta, latinis volucrū aut iuolucrū appellatur: è re ipsa, nēpe q̃ arboribus sese inuoluat, in syluestribus mōtosisq; locis: caulē fert quadratum, fabæ similem: foliū plantaginis, sed p̃ extremam oram lenissime fimbriatum: folliculos, supra caulē in sese inflexos, vt in iride, crebro irretientibus inuicē polyporū cyrrhis. Officinæ & herbarij partim cypriā vocant, partim etiā saponalē, siue saponariā: argumēto quod pinguedinē quandā in aqua saponis modo remittat. Vulgus segeiam appellat, *herbe à siege*.

Periclymenon Græci, latini volucrū maius, herbarij caprifoliū *cheuresuel*. Scribonius Largus syluæ matrem appellat: vnde etiam vulgo matrissylua dicta, & nōnunquam vinciboscū. amplexicaulis est frutex, ramulis lignosis, rufis, geminis per interualla, vmbilicatis folijs, à  
f. iij.

terra cæsijs, supernè herbofis, mollibus, baccis syluestris myrti, vel, quod idem est, rusci, cacumine duobus folijs tunicato, ita vt difficulter eruatur, radice crassa. Inuenitur in sepibus & aruis, conuoluens se fruticibus aut arbusculis propter assidentibus.

Clematis altera, volubilis maior appellata, ramis exit rubētibus, viticosis: ambítque viticulis suis proximas arbores, ijs conuoluendo sese vt smilax. folium ei vehementer exulcerans & acre. Sed de clematide, plura in vineto. nā hæc etiam in vineis nascitur.

Clematidem autem Aegyptiam dictam, quā nonnulli vocant vincam peruincam, inuenies descriptam in arbusto: item etiam in hortulo.

**S M I L A X** aspera, folio est periclymeni, ramulis exilibus, multis, paliuri modo aculeatis. Repit p arbores ambiēdo eas ab imis ad summa vsque. Semen in racemis labruscæ modo cohæret, rubro colore cū ematuruit, gustu leniter mordaci, radice crassa, prædura. locis palustribus & asperis enascitur.

Smilax læuis, folio est hederaceo, molliore, læuigatioreq; palmitibus præter spinas, quib<sup>9</sup> caret, omni alio modo similib<sup>9</sup> supradictæ. Cōuoluit se arboribus, quemadmodum & illa. Semen habet nigrum, vt lupini, & exiguum, super quod circumquaq; flores exiliunt candidi, copiosi, orbiculati. Cæterum topiarius est frutex: per ætates virēs, folijs in autūno cadētib<sup>9</sup>.

**CYCLAMINOS** altera, vulgo sigillū beatæ Marię dicitur, *du seau nostre dame*, folia fert hederacea, minora tantum, caules crassos, vel (vt Plinius inquit) superuacuos, geniculatos, vicinis arborib<sup>9</sup> capreolorū ritu se cōuoluētes: flores cādidos odoratosq<sup>3</sup>: corymbos hederæ, sed molles, aliquantū acres, gustu lentis. radice est nullius vsus in medicina, prælonga tamen & in miram molem extuberante, ita vt merito quoq<sup>3</sup> rapum terræ dici possit.

**MALACOCISSON** etiam putat Ruellius eandē esse cū ea quā vulgo superius sigillū sanctæ Mariæ appellatā diximus. Nāq<sup>3</sup> similitudinem refert hederę, molliore tamē habitu, ac, ne serpat humi, sese vicinis fruticibus volumine crebro cōtorquet: folio hederaceo, flore albo, baccis rubētibus, crassā radice veluti bryoniæ, eadēq<sup>3</sup> altissima, vt vel aquā haurire, vel lābere fodiētib<sup>9</sup> dignoscat. quare radix glutinoso turgēs succo cū friat, in quādam vnguinis speciē resoluta fathiscit. Tā aquę vel cupida vel amās creditur, vt etiā si in asperis offendať p̄silijsse, nimirū aquā subesse quis certior fact<sup>9</sup> fuerit.

**SIGILLVM** quoq<sup>3</sup> Salomonis appellat vulgus nostrum, quod Græci polygonaton dixeret, quia eius radix frequentibus geniculorū nodis interuallata tumeat. profilit in montibus, frutice cubito proceriore, folijs lauri, latioribus & læuioribus, quæ gustata quendam mali cotoneæ aut punicæ saporem referant

cum aſtrictione nonnulla. Flores per ſingulos foliorũ exortus exiliunt candidi, qui flores, foliorũ numerũ lōge ſuperant à radice ad cacumen ſupputati, nam terni aut plures ab vno quoque ſinu foliorum emicant: radice cādida, molli, longa, crebris nodis articulara, denſa, grauiter olente, pollicis craſſitudine: floribus excuſſis, baccæ piſi ferè tuberculo dependent, ex viridi nigricantes, & in quendam ordinem digeſtæ.

## HERBAE LACTE MA.

## NANTES.

Tithymali genera omnia à ſucco lacteo nomen ſumpſerũt, itaq; de ijs ĩprimis agēdum eſt.

PRIMUM tithymali genus, à Græcis characias appellatur quaſi vallis, quòd propter ramos multos vallis & ſepib<sup>9</sup> aptũ ſit: dicit<sup>r</sup> & maſculinus tithymal<sup>9</sup>, aut amygdaloides, quia habeat folia amygdalo vel oleæ ſimilia: hodie magna ex parte vocatur expurgia ab expurgādo, vulgo eſula maior: ſeſquipedali proceritate digitaliq; craſſitudine prouenit, quinis ſenſve caulibus, folijs oleæ ſed lōgioribus, leniter puniātibus, circa radicem duntaxat anguſtioribus, nam in cacumine iunceam comam gerit: radice aſpera, craſſa. inuenitur in aſperis.

Secundum genus vocatur tithymalus fœmina, ſiue myrſinites à folijs, aut caryites à fructu nuci ſimili: folio eſt multo maiore q̃ myrti, acuto, pungente, grauis odoris, ramulis pal-

meis, alternatis annis fructificantibus: fructu nucis similitudine, vnde vulgo officinis, nux vomica dicitur, sed pauciori madet lacte. hac specie in nemoribus sæpe vidimus.

Tertium genus Plinio tithymalus paralius vocatur, siue vno vocabulo tithymalis: Theophrasto coccus, vulgo esula minor: peculiariter etiam nonnulli euigilem matutinū vocant, *du re ueillematin*: furculis est rubētibus, palmum altis, quinis senisve à radice exeūtibus, folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in ordinē digestis, capite in cacuminibus orbiculato, in quo semen, vt eruum emicat, vario colore.

Quartum genus: helioscopion appellāt, quoniam capita cum sole circumagat: vulgus vocat tithymalū coronariū, folijs est portulacæ, tenuioribus atq; rotūdioribus, furculis à radice pdeūtibus quatuor aut quinq; tenuibus, alitudine palmi, rubētibus, albi succi plenis, capite anethi, semine ceu in capitulis. gignitur maxime in ædificiorū ruinis & circa oppida.

Quintū tithymali genus cyparissia vocāt in campestribus nascentem, ita dictū à foliorum similitudine: caule est palmeo, aut eo pceriusculo, subrubente: folijs pin<sup>o</sup>, tenuioribus, mollioribus, exilioribúsq; vt omnino nouella pinus existimari possit.

Sextū, dēdroides dicitur, quoniā arborescit, petrophyos siue petrēū, q in petrosis nascatur, opacans superne in orbē atq; comosissimū, suc



di plenum, ramis subrubentibus, circa quos folia sint myrti sed tenuiora, semen characiæ.

Septimum, platyphyllon vocant, à foliorum latitudine, nulli enim sunt latiora folia, verbasco simile est hoc tithymali genus.

**PITYVSA**, omnibus herbarijs officinisque ac recentioribus medicis, esula nominatur. si quidem esula fruticosa est, caule supra cubiti altitudinem assurgente, geniculato, folijs piceæ, acutis, exilibus, flore paruo, purpureo, semine instar lenticulæ lato, radice crassâ, candida, lacteo succo turgente, quam recentiores græci, Barbarorum freti nomenclatura, torpeton vel turbet appellauerunt.

**LATHYRIS** officinis cataputia minor, vulgo *espurge*, à purgatoria facultate, tithymali vocabulo quibusdam noscitur: frutex est, totius lactis copia turgens, caule cubitali, vacuo, crassitudine digiti, in summo eo sunt alæ, folio in caule oblôgo, amygdalæ simili, cæterum latiore læuiorêque. quod autem ramulorum cacuminibus exit proceriusculum, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura cernitur.

Peplos, quam officinæ esulam rotundam, vulgus vineale reuelium vocat, *reueille matin des uignes*, quodd fumentes antelucanis excitet, in vineis inuentum, nominant. nanque inter vires & in hortis reperitur, frutex lactei plenus succi, folijs rutæ, paulo latioribus, circinnata coma, palmari, humi procumbente, fructu sub

folijs rotūdo, tribus loculis discreto, in quibus semen nigrum, papauerini magnitudine.

SCAMMONIVM, succo etiam fere lacteo manat, alij colophoniam, alij dactylion vocāt. ramos habet multos ab vna radice, tricubitos, pingues, & quadantenus crassos: folia quoque hirsuta helxinæ aut hederæ, molliora, triângula: florē candidū, male olentē, rotundū, & cauum ceu calathus: radicem grauiter olentem, liquo ris plenam, oblongam, crassitudine brachiali, candidam. Colligitur succus capite radice destructo, & in modum testudinis inuersæ inclsa cauernula, vt in ipsam lachryma confluat: quæ deinde minutim excipitur.

RELIQVAE HERBAE TAM  
SYLVESTRES QVAM ETIAM  
MONTANAÆ.

Polemoniū siue polemonia aut phileræria, à certamine regum inuentionis, vulgus herbariorū falso ambrosiā appellāt, rura boscisaluiā, *saulge de bois*. nascitur locis mōtosis, mactis & asperis, cauliculo quadrato, vtroq; latere pdefi tibus folijs, effigie nepetæ, saluiæ modo & scabris & candicantibus: ramulis etiam vtrinque digestis, exilibus, quorum fastigia corymbis hyssopi visuntur spicata, vel, vt verius dicam, coronata, in quibus nigrum insidet semen: radix struthij vel lanariæ herbæ similitudinē refert, prælonga, cubitalis. Non sunt audiēdi, qui persicariam vulgo dictam esse polemoniā ar-

bitrentur, quæ foliū habet melāpyri, aut quod cōsimile habetur, p̄fici: multis calamis ex vna radice micātibz, crebris articulorū nodis, fructu quasi grano milij in racemis summatim dependente: sed ista cratæogoni propria sunt.

De persicaria autē in prato & lacu dicemus quēadmodū etiā de ambrosia in agro, nā hæc potius agrestis & in-segetibus nascēs, illa aquatica & pratis familiaris est.

Symphyti genera, obiter ī hortulo attigim⁹. nūc autē latius describēda symphyti petræi ratio, quādo in syluā cadit, & mōtes poti⁹ amat. Itaq; symphytū petræum, vulgo buglū dicitur, *du bugle*. non enim est ea quæ media cōsolida vulgo appellatur. siquidē petræum, ramos habet origani, tenues, in cacuminibus thymi capitula, præterea surculis multis cōditū est, gustu dulce, odoratū, saliuā ciens: lōgā radicē habet, minoris digiti crassitudine, flore cęruleo, exili: prouenit in petris, vnde nomen habet.

Chamæcyssos in hortulo cum hædera descripta est.

Sanicula quæ vulgo appellatur à sanādis vlceribus, *du senicle*, videtur esse quartū ranunculi genus, quēadmodū in prato describemus: nā huic speciei descriptio saniculæ plurimū adstipulatur, vt nihil discrepare videatur à ranunculo, præterq̃ radice, quæ paulo longior est, & quodammodo nodosa: hac herba syluę, luci, nemora scatent, vt verno tempore, floribus hu-

ius, aliquot ex nostratibus syluis candicent. Folio est vitis aut apij, rubentibus in fine sectionibus, nū maculis quibusdā, surculis quoque rubris ad radicem, quę nullis ei capillamentis fibrata subest, capitulis in summo frutice pusillis subnatis, griseisque, floribus albis, succum foliorum senties ex gustu myrrham plurimum referre.

Cratægonon cum persicarię speciebus in prato describemus, etsi nonnunquam in frutetis atque opacis crescat.

Phyllon, alijs elæophyllon, in montibus & saxosis nascitur, duorum quidem generum: mas arrhenogonon dicitur, foemina thelygonon. bryo similis est folijs, colore magis herba ceo quam oliuę, caule tenui ac breui, radice gracili, flore albo, semine rotundo, maiore quam papaueris. Fructu tantum differunt: masculum enim vuas habet deflorentibus oleis non dissimiles.

Heptaphyllon, vulgo tormentilla dicta, in syluis etiam & montibus nascitur, septem habet circunquaque folia, vtrinque lanuginosa, unde heptaphyllum hoc est septifolia potius quam pentaphyllon dici debet: florem gerit lutescens, qui deinde decidens, capitulum quodammodo aculeatum & rotundum relinquit, in quo semē per angulos occluditur: late ac longe per terram serpit herba, radicem habet longam, humi hærentem, puniceam, qua pharmacopolę quidam vtuntur pro viperarum carne in confectioe theriaces.

Pentaphyllon autem cum triphylo in praetere  
to describemus, nam magis pratenses sunt &  
aquosae quam sylvestres huiusmodi herbae.

ORCHIS siue cynosorchis, vulgo testicul<sup>9</sup>  
canis, & satyrion minus, quod eius radix etiam ma-  
nu gestata venerem concitet, & eum affectum  
quem graeci satyriasin dicunt. in saxosis, petro-  
sis, & sabuletis, atque adeo sylvis frequentius  
apud nos inuenitur quam in vitibus: folijs est  
circiter caulem imum in terra stratis, oleae mol-  
li similibus, longioribus, angustis, laeuius: cau-  
le semipedali, floribus in vertice purpureis, ra-  
dice bulbosa, oblonga, in modum oliuae gemi-  
na: superiore quae durior, & callosior est, infe-  
riore quae mollior & rugosa.

Duplicem cynosorchin quidam faciunt. ma-  
rem non fruticantem, flore spicato, ut plurimum  
albo, interdum nigris maculis variato, folijs  
etiam nigra plumbagine maculatis, tribus ad  
summum: foeminam, internodijs pluribus dis-  
tinctam, ramosiore frutice, flore ad purpuram  
inclinante. Vtrunque genus, radicem gemi-  
nam testes referentem interdum habet, quo-  
rum sinister dextro superior est & breuior, dex-  
ter ut plurimum oblongior & mollior: inter-  
dum vidi tres, quodam veluti naturae ludicio.  
Sunt quibus radix lutea ac in manus effigiem  
ramosa, unde vulgus, manum Christi vocat.  
Sed haec radicem formae indifferenter utriusque  
satyrio conueniunt, ut nihil ob hoc differen-

riæ statuere possim.

Orchis serapias, ab Andrea medico dictus, propter multas vtilitates radice: frequens est apud nos in pratis, tamē etiam in nemoribus, sed ijs nō vsq̃ adeo saxosis visitur: satyrium maius vulgo vocant: folijs est porri, oblongis, latoribus, pinguioribus, ex alarum sinu emicantibus & inflexis: caule palmeo, flore quasi puro puro, nihil olente: radice interdum testiculis simili, interdum manum extensam referente. Certe memini me reperisse pluribus in pratis, & tum maxime circa Medonium pagum nostræ Lutetiæ vicinum, plantam omnes has supradictas notas eleganter referentem, cuius flos delicatissimum spiraret odorem: sed ab alijs plantis, cum quibus vnā crescebat, hoc tantum differentem, quod non vsque adeo spicatum florem gereret: erat enim ille rarior, prominētiior à caule, delicatius purpurascens, & paulo magis expansus: certe caryophyllon redolebat. In summa, quidam ex nostris suauerubentem hyacinthum (de quo tantopere prædicat poeta) esse iudicarunt. Cætera, & folijs, & radice, diceres esse eam herbam quæ paulo ante descripta est nempe cynosorchin.

**HORMINVM** sylvestre (nam de satiuo in hortulo diximus) est quod centrū gallinæ vocāt herbarij, vulgus, *saulge doultre mer*, officinæ gallicum, fortassis pro galli cētro (nā aliud

est gallitricum ) folio est satis ad saluiam accedente, sed paulo latiore, caule sesquipedali, aspero, leuiter hirsuto, in quadrāgulum striato, flore subcæsius, ad aquilini rostri effigiem falcatō, calyculis pluribus in terram depressis, in quibus ad summum quatuor grana reperias parua, rotunda, subflauescentia, læuia, quibus nonnulli vtuntur ad oculos expurgandos.

**R V T A** syluestris vulgo, Arabibus & officinis nostris Harmel, Cappadocibus ( vt inquit Galenus ) moly: planta, colles amans ac læta, specie tamen neque odoratu rutæ similis, sesquicubitali proceritate, cauliculis teretibus, folio minuto, rumicis effigie, sed crispo: flosculis ex luteo candicantibus, odore viroso, siliquis tripartito distinctis, paulo quàm satius longioribus, in quibus triangulum semen, subrufum continetur.

**ELLEBORVS** siue elleborum album, montes & syluas amat, vt frequentissimum sit inuentu apud nos circa eum colliculū nemorosum iuxta Lutetiam cui Bruyeræ nomen est ( an tamen id sit certo, statuere vix audeam libere ) Itali veratrum album appellāt, rustici *du uerare*, folijs est plantaginis, sed paulo atrioribus & interdum latiorib<sup>9</sup> ac minus solidis, canalium dorso rubescentibus, caule quincunciali, ferula ceo, bulborum tunicis obuoluto, radice cepæ modò multis fibris capillata.

Elleborum autem Anticyrēse dictum ( vñs



de prouerbium , nauigandum esse Anticyram  
cui communi sensu sit opus ) sesamoide siue se  
samida quidā vocant: rutæ aut senecionis simi  
litudinē habet, folio paruo, flore candido, radi  
ce gracili, nullius effectus : granū sesamæ gu  
stu amarum , vnde sesamoides maius dictum,  
nascitur tantum in Anticyra.

Elleborum nigrum , etiam veratrum nigrū  
à latinis dictum, ab alijs melampodium, à Me  
lāpode pastore qui primus ea herba purgaue  
rit sanaueritque furentes : paulo altius fruti  
cat, quàm superiora genera, foliāque habet her  
bacea, ferè platani similia, sed minora & spon  
dylio proxima, pluribus incisuris, nigrioraq; &  
subaspera: caulis illi est scaber : flos ex purpu  
reo candicans , & vix modo racemolus , se  
ménque in eo vt cnicī , quod ab Anticyrensi  
bus sesamoides vocatur, purgationib;que ad  
hibetur. Radices nigræ, prætenues, ab vno fasti  
gio pendentes ceparum more , in quibus tan  
tum vsus cōsistit. nascitur asperis collibus sic  
caneisq; locis.

Elleborine , alijs epipactis & borion, frutex  
est pusillus & minimis folijs, quem Plinius in  
Asia & græcia nasci tradit. Non desunt au  
tem qui eam herbam esse contendunt, quæ a  
pud nostras bruyeras parisinas visitur , quam  
elleborum album esse paulo antè existimaui  
mus: liberum tamen in hac re omnium iudici  
um esse velim.

**V A L E R I A N A** quæ hodie vulgo, minor, cognominatur, lucis & cædvis familiaris est, sitientibus & ieiunis locis multo minor cubito cõsurgit, quamuis lætioribus nonnunquam id æquare conspiciatur. Caulis molli lanugine pubet geniculatus, læui purpura candicans, aliquantum striatus. Folia quadamtenus olusatris similitudinem referunt. flosculi summis caulibus emergunt, paruuli, aceruatimque coeuntes, & in purpuram candescentes. Radix ex obliquo capillamenta iacit, & in multas plexiles fibras conglomeratur: odorem emittens pinguem, irim cum grauitate potius quàm nardum subolens. Nostræ matronæ hanc herbam valerianæ nomine agnoscunt, & in febribus ardentibus, carpo admouent, haud scio quàm foeliciter.

**Valeriana** quæ maior dicitur, vulgo *uertentret*, ea est quam Dioscorides Phu, siue nardum creticum appellat: adolescit caule sesquipedali, concauo, articulado, ex purpura candicante, folio olusatris, flosculo lacteo, narcissi effigie (sed qui magnitudine narcissi tamen cedat) per medium leuiter purpurascente. radice obliqua, villosa, subpingui, fibris veratri nigri modo capillata, nardi odorem emittentibus, cū nōnulla grauitate. Colitur hodie apud nos in hortis quàm studiosissime, tum propter plantæ venustatem, tum etiam magis quòd ad multa medicamenta sit utilis.

Inuenitur etiam in incultis circa itinera & prata interdum, herbula cubiti ferè altitudine, folijs nasturtij, lacteo flore, quem estate fūdīt, semine in siliquulis tam exiguo, vt temere visum effugiat, sed vna frequētius radice quàm duab<sup>9</sup> nititur, odore nasturtij quàm acerrimo, cui rura nullum adhuc indidere nomen, quod equidē potuerim extorquere, nisi quodd obiter herbarius mihi pratēsem appellauit valerianā, quodd folium cum primum exit alatum & laciniatim dissectum spectatur.

**A R O N**, vere nouo in nostratibus syluis passim erumpit: quidam à folij figura pedem vituli appellant vulgo, alij sacerdotis virile, quodd pistillum promat exerti ferè genitalis effigie, officinæ corrupto vocabulo Iarum vocant, Mesues lupha vocabulo barbaro nominat: nōnuli dracunculum, siue serpētariam minorem, q̃ sola magnitudine à dracunculo discrepet, cætera sit ei similis. Folia enim promit qualia ferè dracunculi, minora tamen, paucioribus sigillatim lituris, caulē semissem altū, purpurascētem, pistilli facie, in quo fructus croci colore nitet, radice bulbosa, candida. Sed non est omitendum, q̃ ante seminis partum sagaci naturæ artificio dignū erumpit inuolucrū, palmari longitudine, qd̃ mucronata in turbinē vaginula pistillū cōplectitur, & suo fouet sinu, tam est diligens seruandis rerum seminibus natura: sed vbi fructu pręgnans fathiscit in hiatum, solida

pistilli facies dilutior purpura rutilans emergit: & anfractu penitus patente, crocea semina spectantur, quæ in coronæ modum cōcinne contexta, imam eius partem ambiunt.

Dracunculus autem, qui serpentaria maior vulgo dicitur, siue colubrina, & dracontea ab effigie, nascitur in opacis sepibus, simplici caule binum cubitum alto, læui glabrôque, baculi crassitudine, versicoloribus anguium maculis variegato, purpureis etiam intercurstantibus lituris, ita ut planè serpētis habitum colorémque mentiri videatur. In vertice comosò folia prodeunt, sena septenave, crassiore pediculo, digitorum ritu propèdientia, candicantibus respersa notis, rumicis figura, specie tamen hederacea, sed paulo longiore. A foliato scapi fastigio vagina quædam foris herbacea profilit, cubitalis ferè longitudinis, in mucronem sensim turbinata, velut erupturi partus inuolucrum: quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento dissilit in rimam, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensque perit relicto cornu, cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis prima pubertate virentibus, & per adolescentiam cocci rubore rutilantibus, gustu mordaci, odore viroso, quandiu ianthinum illud exerit cornu: radice bulbosa, tenui libro vestita.

Draconteam aliam ostendunt herbarij no-

stri incultis limitibus & lapidosi apud nos familiarem, subrutila radice, draconis conuoluti modo, iunceo cauliculo, glabrescente, per imitantum foliato, spicoso florum vertice, quibus dilutioris purpuræ color inest.

Draconem herbam aliam olitores nostri appellant, toto genere superioribus dissimilem, quam mirabili quodam modo nasci prædicant ex lini semine, raphanis aut scyllæ bulbis incluso, & sic in terram obruto. Herba est pusilla, caule cubitali, nigro & minuto semine, folio tenui & oblongo, acri, utranque originem prodeunte, linguam & folio & radice amburens, aceti & salis gustu. Quapropter hanc quoque inter acetaria olera gratissimam celebrant, quod nec salem, nec acetum exigat, utriusque saporem referens, utriusque parentis dotes (ut puto) retinuit.

PHYLLITIS in opacis & præruptis nascitur, interdum etiam hortorum parietibus (qua propter nonnihil de ea in hortulo diximus, sed hic tamen vberius explicanda) sylvestris ru mex appellatur à quibusdam (inquit Dioscorides) Folia enim habet satis ad lapathum accedentia, longiora, antè lœuia, postèr quibusdam versibus, ceu liris utrinque exasperata cum adoleuerunt: rigent ea quidè & in altum surgunt. Cæterum murorum aut saxorum quibus hæret asperginem sentiens, foris pensiles, ceu vermiculos ostendit, interius summum læ-

uorem representat: nullum florem, caulem aut semen profert: diu viret, contra gelicida hyemis contumax.

**HEMIONITIS**, ea cognoscitur esse, quæ falso nunc ab officinis & herbarijs scolopèdria nominatur, plerisque lingua ceruina: nascitur in petris: Folium fundit dracunculi, instar corniculatis lunæ falcatum: radicibus coheret multis, exilibus, nunquam florescit, nec caulem aut semen parit, estque austeri saporis. Insunt ei à tergo veluti sessiles neruulorum fibræ, quæ paulum in versus vtrinque digestæ prominent.

Hemiomon autem, quod ea mulæ delectentur appellata, siue asplenion, à purgando splene, scolopendrion siue scolopendra aut scolopendrula, à folij similitudine cum scolopendra animali: ea est herba quam totus officinarum atque adeo herbariorum catus antiquo vocabulo ceterac appellant: in petris & opacis atque adeo parietibus siliceis nascens: sine caule, sine flore, sine semine: pediculo nigro, folio primum conuoluto, lanuginoso, mox dextantali, angusto, corrugato, superne viridi, fuluis neruulis imbricato, variatoque, vtrinque polypodij modo dissecto: radice limosa, cauernosa sicut filicis, candida, hirsuta.

Phalangium, quã aliqui phalangiten vocant, in collibus prouenit, ramulos duos emittens vel tres, pluresve in diuersa tendentes, flos illi candidus, lilio similis, multis incisuris præcin-

ctus, semen crassum, nigrum, latum, ad lenticulæ dimidiatæ figurā, multo tamē tenuius: radícula est gracili, herbacei coloris cum eruitur.

**HYPERICON**, vulgo herba perforata, *mil le partuis*, quodd folia soli obiecta innumeris foraminibus scatere videantur, alijs androsæmon quodd folia & flores triti sanguinem veluti humanum resudent, Galenus etiam ascyron & ascyroides nuncupari tradit, vulgus herbam Sancti Ioannis appellat: in syluis nostratibus plerunque crescit. Sed & etiam in agrorum semitis interdum surculosa est herba, dodrantalis, subrubens, folio rutæ, flore violæ matronalis forma, quem si digitis libeat terere, manus inuenies sanguine cruentatas. nam & oleum in quo flos fuerit maceratus, sanguineum concipit colorem. siliquam gerit teretem, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente: nanque si nares consulas, siliqua semen que tibi resinaceum odorē repræsentabūt. Duo in hyperico inueniūtur, quæ tibi certitudinis faciāt fidē, cruētus comæ florisque triti liquor, odor silique seminisque resinaceus, quæ vix in alijs quibuscunq; huiusmodi speciebus reperiantur.

Androsæmon aliud est hyperici genus, *dionysias* cognominatum (inquit Galenus) nam inter hyperici speciem cōnumerādum est: in agris potissimū crescēs, sed non perforatū. Herba est fruticās prætenuibus festucis, surculos & ramos rubētes fundēs, folijs effigie quidē rutæ,



sed duplo triplóve maioribus, neq; perforatis, & cum teruntur, succo sanguineo manātibz, cauis alarum multis, à quibus in cacumine stolones prodeunt pinnati, in quibus flores pusilli, lutei, & in calyculis semen veluti nigri papaueris, lineis depictū. Comē tritē resinofus odor.

*Hypericon vernaculum* nusquam non proueniens, amplitudine à superioribus differt, maioribus ramis furculosioribzsq; & omnino rubentibus, folio tenui, floribus luteis, semine resinoso, qui cum atteritur digitos cruentat, quā ob causam *androsæmon* etiam dicitur. sed rarissime perforatum conspicias.

*Androsaces* (quantū ego conijcere possum) minimum est omnium supradictarum specierum, & tamen quandam veluti formam hyperici refert, & in syluis ac collibus succrescit. nō vsque adeo alte fruticans, vt vno tantum furculo aut ad summum duobus adsurgat, floribus & folijs minoribus, leuioribus, ac viridioribus, quæ pertusa quidem conspiciuntur, sed trita sanguinem non refudant.

*CHAMÆDRYS* quasi humilis quercus à foliorum similitudine, Plinio quercula, alijs trifago & ferratula, vulgo *germandree*, in petrosis, & asperis nascitur. statura tota digitorum quatuor altitudinem non excedit, folijs paruis, effigie & diuisura quercus, amaris: flore penē purpureo, exili semine, in singulis calyculis, atro,

*Chamædrys* siue *calamintha sylvestris*, quā etiam latini *trissaginē palustrem* nomināt, ru-  
ra *chamaram*, in montibus æque ac palustrib⁹  
nascitur, folio *trissaginis*, rariuscule per ambi-  
rum serrato, modice lanuginoso, aliū subolens  
te, gustu amaro & astringēte, quadrāgulis cau-  
libus, subrubro flore. Certe ea est quam nos iu-  
re cū omnibus doctis *scordium* appellare de-  
bemus. Falluntur autem plurimū in hoc her-  
barij qui hactenus pro *scordio* sumpserūt her-  
bam bicubitali proceritate, folijs vrticæ, par-  
uis, fimbriatis, à pediculo latioribus: allium ve-  
hementer odorantibus, si terantur, flosculo la-  
cteo, exili in pelliculis semine, radice oblonga,  
eiusdem cum folijs odoris. quapropter vulgus  
nostrum *alliariā* vocat. potius autē esset *scor-*  
*diosis*, q̄ verū quod descripsimus *scordium*.

*CHAMÆPITHYS* in agro describetur  
postea.

*MYOSOTIS* altera, inter alsines genera  
connumeranda venit, crescit enim in lucis &  
opacis ac locis alsiosis: quapropter priorem al-  
sinem in vineto descripsimus, alteram in hūc  
locū seruantes. vulgare nomen apud nos nul-  
lum habet, multos producit caules ab ima ra-  
dice prodeūtes, quadantenus à terra rubros  
& concauos: folijs est angustis, oblongis, non  
sine dorfi prominentis exertu, nigricantibus,  
per interualla deinceps geminatim copulatis,  
in mucronem desinentibus: coliculis ex alarū

sinu prodeuntibus: flore cæruleo, radice digiti crassitudine, multis fibris capillata, satis ad scopulopendrium accedente.

Pilosella autem quam vulgus appellat, siue etiam dicatur auricula muris, in syluis & montibus crescens: non respondet superiori delineationi, est enim folijs quadrantalibus, lanuginosis, albicantibus, in terram sparsis, flore luteo, radice numerosa sed exili, humi quidem in terram proserpit & nunquam à solo sustollitur, sed cætera non conueniunt. Itaque vulgare tantum nomen huic relinquamus.

**DICTAMNUM** siue dictamnus, item etiã dictamus, vulgo diptamnum: in sola Creta nascitur, atque adeo solo monte Ida: vnde illud Virgilij,

Dictamnū genitrix Crætæa carpit ab Ida.

Qui autem illic fuerunt, herbarum sagacissimi indagatores, mihi retulerūt tria in ipso monte dictamni genera à se inuicem diuersa succrescere, quorū quod in summo montis iugo crescit, tenuioribus est ramis ac folijs, pulegio similibus, nullo aut caule aut semine, omniū esse optimū prædicāt: quod vero in valle atque adeo ima montis parte latioribus assurgit folijs, & gustu mordacioribus, id pseudodictamnū nominarunt. In medio autem montis, aliam quādam dictamni speciē asseuerarunt nasci, proxime accedentem ad verū dictamnū, cuius ego folia ab ijs accepta, hodie diligenter adseruo:

sunt autem proxime ad origanum tendentia, lanuginosa, odorata, gustū mediocriter pūgentia. Quod præterea de dictamno proferā, certē mihi non est in promptu. Nam speciem eam quam vulgo ostēdūt pharmacopolæ, nullo pacto dictamnum esse crediderim. Quin nec radicem quam proferunt è Creta allatā, qua pesti insigniter mederi se quidam iactitant, nunquā existimarim esse dictamni, radices enim habet minimas & omnino inutiles. Quo minus est mirum si in herbarum cognitione multi quotidie nobis imponant.

**CACALIA** siue leontice in mōtibus crescit, vulgo agreste carni dicta: Fruticosa est herba, semine minutis margaritis simili, inter folia magna pēdulo, quæ ad oleagina vel quærna satis accedunt.

**EUPHRASIA** Græcis dicta, quoddam lætitiā pariat, aut voluptates augeat, nascitur in apricis collib<sup>9</sup>, autumnō præcipue, herbula est ad hyssopum ferè accedens, sed pusilla admodum, cauliculis purpureis, folio paruo, per ambitum serrato, floſculo interdum albicante, interdum subcœruleo, macula veluti aurea per medium insigni. Quidam pampinulæ similem fecerunt, folio tantum minore ac magis serrato & lentiusculo, minus fruticosam, flore luteolo.

**GEVM** nōnulli eam esse suspicantur, quam vulgus, diaboli morsum appellat, quod si ita

est, sesquipedali fastigiatur altitudine, folijs bu-  
glossis læuioribus, solidioribus & leuiter laci-  
niatis, flore purpureo, radicibus nigris & cir-  
cūrosis, vnde vulgare nomen. nascit̃ in opacis.

Iuxta ruinpotinā arborem vel populos præ-  
cipue viduas, nasci Plinius tradit herbam quā  
Galli (inquit) **R O D O R A M** vocant: caule vir-  
gæ ficulneæ modo geniculato, folijs vrticæ, in  
medio exalbidis, quæ procedente ætate tota  
rubentia conspiciuntur, flore argenteo.

**A S C L E P I A S** ab Asclepiade inuentore di-  
cta, à quibusdam cission siue cissophyllon à  
foliorum similitudine, vnde nonnulli ex no-  
stris hederalem vulgo vocarunt: inuenitur in  
nostris montibus & syluis: Fruticosa est her-  
ba, ramis oblongis, folio hederaceo sed amplexi-  
caule, flore grauis odoris, semine securida-  
cæ, radice numerosa, tenui, odorata.

**O R I G A N V M**, etsi quòd in montibus cre-  
scat nomen habet, tamen quia in hortis hodie  
diligentissime colitur, eius genera in hortulo  
requirito. Illic etiam pulegij montani descri-  
ptionem videto.

**S E S E L I** Massiliense, quidam saxifragiam  
maiores appellauerunt, quòd medijs è saxi-  
is erumpat, alij falso siler sed mōtanum, nam in  
montibus crescit atque interdum etiā in pra-  
tis, folijs foeniculi, crassioribus tantum, caule  
vegetiore, umbella anethi, in qua semen oblon-  
gum, angulosum, degustanti acre: radix ei lon-

ga est,iucundi odoris.

Seseli Aethiopicum,folio est hederaceo, sed minore,in longitudinem porrecto periclymeni modo:frutex alioqui magnus, farnētis bicubitalibus,in eoque dodrantaes rami,capitula vt anethum,semen tritici modo densum,nigrum,amarū, acrius & odoratius quàm Massiliense,perquàm suaue est.

Seseli Peloponnesiacum folijs est cicutaë, sed latioribus & crassioribus, excedens Massiliense caulis amplitudine, quem ferulaceū continet. Summum eius lata vmbella occupat,semē complexa odoratum,latius, carnosius.prouenit in locis asperis, riguis collibus,insulis.

Tordylion quod & creticū Seseli cognominant,Paulus gordylion,alij Syreon(inquit Plinius)nascitur in Cilicia mōteAmano,herbula fruticosa,seminis rotundi, geminatiq;, forma clypeolari, gustu subaspero,bene olēte radice.

ASTRAGALVS Romanis talus,grandula & ficus terræ,nostri vulgo cicer montanū vel rusticum:Herba est fruticans, folio & ramis ciceri similis,flore purpureo,paruo,tereti radice,raphani modo grandī,quæ adnatas habet appēdices admodum duras,veluti cornua inter sese implicatas,gustu astringentes: Inuenitur in petrosis,& locis vēto perflātis. Cicericulā esse diceret,nisi radix tanta subesset,Vulgus nonnunquam syluestres cerras vocat,hoc est,cicerculas.

**DELPHINIVM** à foliorum cum delphino incuruo similitudine appellatum, eā esse putāt quidam quæ, à nostris herbarijs vulgo dicitur, filius ante patrē: fortassis recti⁹ appellaturi, si partus ante conceptū dicerent: siliquam enim & semen ante floris exitum ostendit: Buccinariam alij vocant, ob teretis siliquulæ per extremum in expansum florem exeunte similitudinem. Inuenitur in asperis, & locis totius diei solem accipientibus: surculis à radice vna pedalis, folijs paruis, tenuib⁹, intersectis, incuruis, lōgiuscula delphinis effigie, flore violæ matronalis, subpurpureo, semine in valuulis teretibus exiguo, milio nō dissimili. Hallucinātur qui delphinium esse senā Mauritanis dictam existimant, reclamante perquam euidenter totius herbæ pictura.

**PEVCEDANVM** à pinu vel amaritudine sic dictum, in montibus opacis gignitur, caule tenui, macilento, sceniculo dēsitare simili, iuxta tertiam comofo, flore luteo, radice nigra, succosa, grauis odoris, crassa. Eius herbæ succo & radice medici vtuntur.

**EPHEMERON** putat esse Ruellius ex descriptione Dioscoridis, quod hodie vulgo liliū cōuallis appellatur, *du muguet*, de quo in hortulo diximus: nascitur enim sua sponte in opacis & lucis: vnde nomē lilij cōuallēsis: caule multo, tenuiore, flore cādido, suauiter olēte, gustu subamaro, semine molli, radice digiti minimi



crassitudine, singulari, longa, astringente, odorata. Dicta Ephemerum quod flos eius confestim deciduus non longius quàm vno aut altero die integer appareat, vel quod eo decempro, dies vna sit ei vita longior, adeo fugaci sorte prædita est hæc planta.

**CENTAVRIVM** maius, quod vulgo (sed falso tamē) reuponticum dicitur, & cuius radix pro rhapōtico ostenditur: colles amat qui pubentibus virēt lucis, & nemoroso cingitur orbe, gaudet apricis, frutetosis tractib⁹ & arboribus cōferētis. Planta est ab radice fruticosa, caulibus ternū cubitorū, geniculatis, folio iuglandis, per ambitum creuato, virenti & oblongo, flore subcæruleo, capitibus papaueraceis, semine cnici, radice vasta, fragili, tenera, rubescēte, succo rubro madēte. Quod autem vulgo centauriū maius ostenditur, & cētaurea maior appellatur, lysimachiam esse putat Ruellius.

Centauriū minus in lacu describetur.

Verbascū sylvestre, itē etiā Aethyopis in agro explicabit, quēadmodū & syderitidis species.

**BETONICA** M. latini appellāt, quā Græci cestron, quod locis alsiosis gaudeat, vulgus *butoesne*: caule assurgit cubitali vel eo altiore, quadrato, folijs quernis, per ambitum serratis, proxime radicē maioribus, odoratis, semine in summis caulib⁹, modo satireiæ spicato: floribus purpureis, radice veratri, numerosa, tenui.

Betonica altilis, item alia quæ Britannica

dicta est, ad hortulum attinet.

Hactenus sylvestres herbas descripsimus. campestris in agro, pratenses in prato postea explicaturi: Quo eodē loco etiam palustres & aquaticas videbitis. item boletorū & fungorū omnia genera: nam vel Horatij testimonio, Pratensibus optima fungis Natura est, alijs male creditur.

Itaque fiet, ut agro & prato descriptis nihil aut parum admodum supersit, quod in re herbaria præterea desiderari queat: modo ne sint eo ingenio adolescentuli, qui nostram audaciam temere culpent, aut id nobis dent vitio, quod à quibusdam dari solet: non omnia recte se habere, quædam esse brevius quàm par sit, alia fusius explicata, nonnulla etiam paulo negligentius prætermissa. Sed sint ij quidem difficiles, ingrati, non ingenui: qui ob hoc laborem alienum contemnant, quod omni ex parte nō sit absolutus, quasi vero id vel ipsi vel quivis hominum præstare exactissime possit. Quapropter adolescentuli huiusmodi ingenijs nolite operam dare: quin potius estote faciles, in bonam & æquam partem omnia accipite, si quid omissum, id vero animadvertite, & libellis vestris adscribite, si quod etiam deterius prolatū aut assertum, emēdate: vobis enim id maxime licet, per nostram auctoritatē. Interea bono estote animo, dum reliqua vobis apparamus.

# INDEX.

Cedrius liquor	<u>23. 2</u>	Cysson, Cyssophyllon	
Cedrula	<u>23. 1</u>		<u>54. 2</u>
Cedrus	ibidem	Cisthos	<u>33. 1</u>
Cedrus phœnicia	ibidē	Cisthi ladaniferę genus	
Centrū gallinæ	48. 2	ibidem	
Centauriū maius	<u>56. 1</u>	Citharon	ibidem
Cerra syluestris	55. 2	Citrus	27. 1
Cerrus	<u>10. 2</u>	Clematis altera	<u>43. 2</u>
Cestron	<u>56. 1</u>	Clematis ægyptia	ibidē
Ceterac	52. 1	Clymenon	43. 1
Chamara	53. 1	Coccali	14. 1
<u>Chamēdrys 9. 2. &amp; 53. 1</u>		Coccalos	<u>17. 1</u>
Chamæpitys	53. 2	Coccum	<u>13. 1</u>
Chamælea	<u>33. 2</u>	Colere syluam	<u>3. 1</u>
Chamēcyparissos	<u>18. 2</u>	Colycea	27. 2
χαρίτες	<u>17. 2</u>	Colligere glandē	3. 2
Chia lentiscus	<u>19. 2</u>	Collis	<u>41. 2</u>
Cyathi filigni	42. 1	Colophonia	<u>46. 1</u>
Cicer montanū	55. 2	Colubrina	50. 2
Cicercula	ibidem	Colutea	33. 2
κηκίδες	7. 1	κωνοφόροι	<u>14. 1</u>
Cyclaminos	44. 1	κωνος	<u>14. 1. &amp; 16. 1</u>
Cinnamomum	<u>37. 2</u>	Coniferæ arbores	14. 1
Cynocrambe	41. 1	Consolida media	<u>46. 2</u>
Cynosorchis, mas & fœ		Conseminea sylua	<u>3. 2</u>
mina	<u>47. 2</u>	Corona quercea	9. 2
Cynorrhodus	<u>40. 2</u>	Cortex thuris	21. 2
κυπάρισος	<u>17. 2</u>	Corticata resina	<u>14. 2</u>
Cypria	43. 1	Cotonum	<u>40. 2</u>
Cissaron	33. 1	Cratægon	<u>13. 1</u>

h. ij.

# INDEX.

Cratægonon	<u>47. 1</u>	Eleophyllon	<u>47. 1</u>
Cretica cupressus	<u>18. 1</u>	Elleborine	<u>49. 2</u>
Cupressetū	<u>3. 2</u>	Elleborū āticyrēse	<u>49. 1</u>
Cupressi galbuli	<u>18. 1</u>	Elleborū nigrum	ibidē
Cupressi nuces	<u>18. 1</u>	Elleborus	<u>48. 2</u>
Cupressus	<u>17. 2</u>	Ellebor <sup>9</sup> sesamoides	<u>49</u>
D			
Dactylion	<u>46. 1</u>	Ephemeron	<u>56. 1</u>
Dadion	<u>17. 2</u>	Epipactis	<u>49. 2</u>
Daphnides	<u>23. 2</u>	Erice	<u>30. 1</u>
Daphnoides	<u>38. 2</u>	Erythros	<u>30. 2</u>
Darca	<u>39. 1</u>	Esula	<u>45. 2</u>
Das	<u>17. 2</u>	Esula minor	<u>45. 1</u>
Delphinium	<u>55. 2</u>	Esula rotunda	<u>46. 1</u>
διενδρολίβανος	<u>21. 1</u>	Etymodrys	<u>9. 1</u>
Dictamnium	<u>53. 2</u>	Euigil matutinus	<u>45. 1</u>
Dionysias	<u>52. 2</u>	Euonymos <sup>9</sup>	<u>31. 1</u>
Diosporos	<u>28. 1</u>	Euphrasia	<u>54. 2</u>
Dorycnion	<u>33. 1</u>	Euthyphlæos	<u>11. 1</u>
Draco herba	<u>51. 1</u>	Excoriari <sup>9</sup> frutex	<u>30. 2</u>
Dracontea	<u>50. 2</u>	Expurgia	<u>44. 2</u>
Dracunculus	<u>50. 2</u>	Externe arbores resina	
Dryon hyphear	<u>10. 1</u>	ceæ & coniferæ	<u>19. 1</u>
Dryopteris	<u>42. 2</u>	F	
Drys	<u>6. 2. &amp; 9. 2</u>	Fagus	<u>11. 2</u>
Duo fraxini gña	<u>26. 1</u>	Fagus câpestris	<u>12. 2</u>
E			
Ebenū Gajacū & Ber,		Fagina glans	<u>11. 2</u>
filicum	<u>29. 1</u>	Febris querquera	<u>9. 2</u>
Elate	<u>15. 1. &amp; 2</u>	Ferula	<u>34. 1</u>
		Ferulago	<u>34. 2</u>
		Ferulæ duo gña	<u>34. 1</u>

# INDEX.

Ferula syluestris	<u>34. 2</u>	gosa, asinina, flaua,	
Fictitia myrrha	22. 1	candida, nigra	<u>7. 2</u>
Ficus terræ	55. 2	Gallæ	<u>7. 1</u>
Filic astrum	42. 2	Galla carpina	25. 1
Filicula	42. 2	Gallicū Silphiū siue la,	
Fili ctum	41. 2	serpitium	35. 1
Filigni cyathi	42. 1	Gallitricum	48. 2
Filius ante patrē	55. 2	Genista	<u>30. 1</u>
Felix mas & foemina		Gerandryon	<u>8. 2</u>
42. 1		Germandrea quæ vul,	
Fluida	30. 2	gō dicta	52. 2
Foemina abroton <sup>9</sup>	18. 2	Geum	<u>54. 2</u>
Foemīa cupressus	<u>18. 1</u>	Glandē colligere	<u>3. 2</u>
Fraxinus	25. 2	Glandes	4. 2
Fraxin <sup>9</sup> bumelia	26. 1	Glandaria sylua	3. 2
Frons querneæ	<u>9. 2</u>	Glādiferæ arbores	<u>8. 2</u>
Frutetum	<u>29. 2</u>	Glans fagina	<u>11. 2</u>
Frutex	29. 2	Glans querna	<u>9. 2</u>
Frutex exkoriari <sup>9</sup>	30. 2	Glycyrrhidia	<u>39. 2</u>
Frutex ferulaceus	<u>34. 2</u>	Glycyrrhiza	<u>39. 2</u>
Frutetosus locus	29. 2	γλεῖνον	25. 1
Fusanum	<u>31. 2</u>	Gordilion	55. 2
Fusaria	ibidē	Grandula	ibidē
Fusterna	15. 1	Granū paradisi	<u>37. 2</u>
	<b>G</b>		<b>H</b>
Galba	<u>18. 1</u>	Halimos	<u>33. 2</u>
Galbæ	ibidē	Haliphleos	<u>11. 1</u>
Galbuli cupressi	ibidē	Hammoniacum	<u>34. 2</u>
Galla solida, omphaci-		Hammonis Iouis de,	
tis, perforata, fun,		lubrum	<u>34. 2</u>

# INDEX.

Harmel	48. 2	Ischina spina	19. 2
Herba infaniofa	32. 2	Italica lentiscus	ibidē
Herba S. Ioānis	52. 1	Iuniperus	18. 2
Herba perforata	51. 1	Iuniperus arceuthos	
Herbē arboribus circū-	18. 2		
uolutæ	43. 1	L	
Herbæ lacte manantes		Laburnum	28. 1
44. 2		Lacta	39. 1
Hemeris	9. 1	Lama	19. 2
Hemionon	51. 2	Lanigera arbor	40. 2
Hemionitis	ibidem	Larignū castellum	19. 2
Heptaphyllon	47. 1	Larix	19. 1
Hypericon	52. 1. & .2	Laserpitiū & laser	35. 1
Hypocisthis	33. 1	Lathyris	45. 2
Horminū syluestre	48. 2	Latifolia quercus	10. 2
I		Lauandula	37. 1
Iarus	50. 1	Lētiscus, Lētiscus Chia,	
Ilex aquifolia	13. 1	Lētiscus Italica	19. 2
Ilex fœmina, agrestis,		Leontice	54. 1
coccifera	13. 1	Leucea	30. 1
Ilex, iliceus, ilign <sup>9</sup>	12. 2	Libanos	21. 1
Ilex nigra	13. 2	Lycia	23. 1
ἱλν	3. 1	Lygea	30. 1
Illicæ trabes, iligna		Lygon	ibidē
frons, ilicetum	12. 2	Lilium conuallis	56. 1
Incensum	21. 1	Lingua auis	28. 2
Indica Terebinth <sup>9</sup>	20. 2	Lingua ceruina	51. 2
Inuolucrum	43. 1	Liquidus styrax	22. 1
Iouis barba	28. 1	Liquor cedrius	23. 2
Iouis glans	5. 2	Lyfimachia	56. 1

Locus frutetosus	29. 2	Myrobalani	6. 1
Lorus arbor & herba		Myrobalanus Arabica,	
13. 2		Aegyptia, Syriaca,	
Lucus	4. 1	Thebaica, Troglody-	
Lunaria maior	42. 2	tica, Aethiopica	6. 1.
Lupha	50. 2	Myrobalanus lutea, In-	
M		da, Damafonia, Cepula,	
Macedonica cern <sup>o</sup>	11. 1	ēpelitica, beletzica	6. 2
Mala cedria	23. 2	Myfen	12. 1
Malacocysfos	44. 1	Mittere porcos ad pa-	
Malum pineum	17. 1	scua	3. 2
Malū robustum	8. 2	Moly	48. 2
Manus Christi	48. 1	Montanus	25. 1
Mastiche	19. 2	Mōtanum cicer	55. 2
Mastiche Chia candida		Montanū fefeli	55. 1
ibidem.		Morsus diaboli	54. 2
Mas cupressus	18. 1	Moschocaryon	6. 1
Matrisfylua	43. 2	Moselyticū germē	39. 1
Melampodium	49. 1	Mouere anagyri	31. 2
Melia	25. 2	N	
Melligreta	37. 2	Nardū celticum	36. 1
Milea	25. 2	Nardū creticum	50. 1
Mydion	9. 1	Nardū gāgicum	35. 1
Myosotis altera	53. 1	Nardū montanū	36. 2
Myrrha	21. 2	Nardum indicum	35. 1
Myrrha fictitia	22. 1	Nardū Sāphariticū	35. 2
Myrrha resina	ibidē	Nardū Syriacum	ibidē
Myrrha stillatitia	ibidē	Nartheca	34. 1
Myrice	30. 1	Narthex	ibidē
Myssijpopuli	12. 1	Nemus	4. 1



Nyctegregon	<u>42. 2</u>	Oxya	<u>12. 1</u>
Nyctilops	ibidem.	Oxymyr sine	<u>30. 2</u>
Nymphea	<u>42. 1</u>	Ozen	<u>39. 1</u>
Nuces cupressi	<u>18. 1</u>	P	
Nux muschata	<u>6. 1</u>	Pilosella	<u>53. 2</u>
Nuces pineæ	<u>14. 1</u>	παλίμπιασα	<u>14. 2</u>
Nuclei pinei	<u>16. 2</u>	Part <sup>9</sup> âte cōceptū	<u>55. 2</u>
Nux odorata	<u>6. 1</u>	Pascuarij	<u>4. 1</u>
Nux pinea	<u>17. 1</u>	Pedifera picea	<u>17. 1</u>
Nuxsapinea	<u>17. 1</u>	Pentaphyllon	<u>47. 2</u>
O		Peplos	<u>45. 2</u>
Oenothera	<u>41. 1</u>	Periclymenon	<u>43. 1</u>
Oleosa cedrea	<u>24. 1</u>	Persicaria	<u>46. 2</u>
Oleum picinū	<u>15. 1</u>	Pes vituli	<u>50. 1</u>
Olybanum	<u>21. 2</u>	Pes Alexādrinus	<u>32. 1</u>
Onagra	<u>41. 1</u>	Pes columbinus	<u>37. 2</u>
Onyche	<u>37. 1</u>	Peucedanum	<u>55. 2</u>
Onuris	<u>41. 1</u>	Phalangium	<u>52. 1</u>
Opobalsamū	<u>40. 1</u>	Phellos	<u>13. 2</u>
Opos cyrenaicos	<u>35. 1</u>	Phellodrys	<u>13. 1</u>
Orchis	<u>47. 2</u>	Philyca	<u>24. 1</u>
Orchis serapias	<u>48. 1</u>	φηρός	<u>11. 1</u>
Origanon	<u>55. 1</u>	Phyllitis	<u>51. 2</u>
Orneoglossum	<u>28. 2</u>	Phyllon	<u>47. 1</u>
Ornus	<u>26. 1</u>	Philura	<u>24. 1</u>
Orobethron	<u>33. 1</u>	Phœnicia cedrus	<u>23. 1</u>
Orobia	<u>21. 2</u>	Phthiropœos	<u>17. 1</u>
Osmūda regalis	<u>42. 1</u>	Phu	<u>49. 1</u>
Osmundula arborea	<u>42. 2</u>	Picea	<u>17. 1</u>
		Piceaster	ibidē

# INDEX.

Picea pedifera , sylue		Platyphyllos tithyma,	
stris,tineosa	17. 1	lus	10. 2
πίλαρα	14. 2	Plestinga	34. 1
Picis bitumen	15. 1	Polemonium	46. 1
Pylos	8. 1	Polygonaton	44. 1
Pilula nuci similis,conis		Polypodium	42. 2
gera,sessilis, conuolu		Pomum pineū	17. 1
ta	8. 1	Porta querculana quæ	
Pilulæ	7. 1 & 2	& viminalis	9. 2
Pinaster	16. 2	πίριος,πίρινος	12. 2
Pinea nux	14. 1.&17.1	Pseudocasia	39. 1
Pineum malum	17. 1	Pseudonardum	36. 2
Pinus	16. 1	Psilothron	42. 2
Pinus foemina & mas		Ptarmice	32. 1
mōtana & maritima.		Pteris nymphæa	42. 1
16. 2.		Pteris,Pterion	42. 1
Pinus syluestris	ibidē	Q.	
Piper	29. 1	Quercea corona	9. 2
Pirenæi saltus	4. 1	Quercetum	4. 1
Pyrethron	32. 1	Quercula	9. 2. 33. 1
Pyrethrū syluestre	32. 1	Querculana porta	9. 2
Pissasphalton	15. 1	Quercus	9. 1
Pisselæon	ibidē	Quercus latifolia	10. 2
Pityida	17. 2	Quermes quermesinus	
πίτινι	14. 2	13. 1.	
πίτις	17. 1	Querna glans	9. 2
Pityusa	45. 2	Quernea frons	ibidē
Pix	14. 2	Querquera febris	ibidē
Pix liquida , pix sicca		Quibus glandibus viue	
15. 1		bant antiqui.	5. 1

R.		Ruta syluestris	48. 2
Recticortex	11. 1	Rusticum cicer	55. 2
Reueliū vineale	45. 2	S.	
Resina	14. 1. & 21. 1	Sacerdotis virile	50. 1
Resinaceę arbores	14. 1	Sagapenum aut sagape- nion	34. 2
Resina corticata, ligno- sa, Tyrrhenia, Gallica, Cypria, Syriaca, Colo- phonia	14. 2	Saliuaris	32. 1
Resina larigna, abieti- na, terebinthina, sicca, liquida	ibidē	Saliunca	36. 1
Resina myrrha	22. 1	Salsicortex	11. 1
Res robusta vetustate	8. 2	Saltuarij	4. 1
Reuponticum	56. 1	Saltus	ibidē
Rhus	30. 2	Saltus pirenæi	ibidē
ῥυτίνας	14. 2	Sanicula	46. 2
Robor	8. 2. & 9. 2	Sapinea nux	17. 1
Roboris genera	9. 1	Sapinus	15. 1
Robur accusationis	8. 2	Saponalis, Saponaria	
Robur ætatis	ibidē	43. 1. Saron	8. 2
Robustus animus	ibidē	Saronianus sinus	ibidē
Robusta res	8. 2	Satyrion minus	47. 2
Robustū malū	ibidē	Saxifragia maior	55. 1
Rodora	54. 2	Scammonium	46. 1
Rosa canina	33. 1	Scordiotis	53. 2
Rosago	ibidē	Schinides	19. 2
Rumex syluestris	51. 2	σχίνοϛ	ibidē
Ruscus	30. 2	Scissima	12. 1
		Scythica radix	39. 2
		Scolopēdria scolopen- drula	51. 2
		Scordion	53. 1
		Scrota sacerdotū	31. 2

# INDEX.

Segera	43. 1	Syluestris calamintha	
Semen Iouis	28. 1	53. 1	<a href="#">ibid.</a>
Semyda	25. 2	Syluestris picea	17. 1
Sena	55. 2	Syluestris pinus	16. 2
Serapinum	34. 2	Syluestris rumex	51. 2
Serere syluam	3. 1	Syluestris ruta	48. 2
Serpētaria maior	<a href="#">ibidē</a>	Symphytū petræū	46. 2
Serpētaria minor	50. 2	Synus faronianus	8. 2
Sesamoides mai <sup>9</sup>	49. 1	Syringodes dicta casia	
Seseli massiliense, æthio		39. 2	<a href="#">ibid.</a>
picū, poloponnefiacū,		Smilax aspera	43. 2
Creticū, Syreon	55. 1	Smilax læuis	<a href="#">ibidē</a>
Syderitis altera	42. 2	<i>σμίλα</i>	21. 2
Sigillum beatæ Mariæ		Solanum insanū	32. 2
44. 1	<a href="#">ibid.</a>	Solanū soporiferū	32. 1
Sigillū Salomonis	44. 1	Solatrum marinum &	
Siler montanum	55. 1	dormitorium	32. 2
Silphion	35. 1	Solatrū mortale	<a href="#">ibidē</a>
Sylua	3. 1	Spartion Sparton	30. 1
Syluula	4. 1	Sphagnon	11. 1
Sylua cædua	3. 1	Spina ischina	19. 2
Syluam cædere	<a href="#">ibidē</a>	Staete	22. 1
Syluam colere	<a href="#">ibidē</a>	Stillatitia myrrha	22. 1
Sylua cōfeminea	3. 2	Styracis genera	22. 2
Sylua glandaria	<a href="#">ibidē</a>	Styrax calamita	<a href="#">ibidē</a>
Syluam ferere	3. 1	Styrax liquidus	22. 1
Syluæ mater	43. 2	Strychnon hypnoticon	
Syluestre pyrethrum		32. 1	<a href="#">ibid.</a>
32. 1		Strychnō manicū	32. 2
Syluestres ceræ	55. 2	Strobili	14. 1 & 16. 2

Suber	<u>13. 2</u>	Thuia	ibidem
Suberiquercus	<u>13. 1</u>	Thus	21. 1
Succus Cyrenaicus		Thuris arboris lachry-	
35. 1		ma	ibidē
Succus Ponticus &		Thus foemininū	21. 2
Medicus	ibidē	Thus masculum	21. 1
Sudor quercus	<u>10. 1</u>	Tilia	24. 1
Sumac	<u>30. 2</u>	Tineosa picea	<u>17. 1</u>
T.		Tithymali genera	<u>44. 2</u>
Tamariscus	<u>30. 1</u>	Tithymalis	<u>45. 1</u>
Tamarix	ibidē	Tithymalus characias,	
Tarentina cupressus		vallaridis, masculinus,	
<u>18. 1</u>		amygdaloides	<u>44. 2</u>
Taxus	26. 2	Tithymalus dēdrodes,	
Teda	<u>17. 2</u>	petrophyos, petræus,	
Terebinthina	20. 2	platyphyllos	45. 2
Terebinthus	20. 1	Tithymalus foemina,	
Terebinthus Indica		myrsinites, paralius,	
20. 2		helioscopios, corona-	
τέρμινθος	20. 1	rius, cyparissias	45. 1
Testiculus canis	<u>47. 2</u>	Tordilion	55. 1
Thapsia	<u>34. 2</u>	Tormentilla	<u>47. 1</u>
Theligonon	<u>47. 1</u>	Torpeton	<u>45. 2</u>
Thelipteris	<u>42. 1</u>	Trissago	9. 2
Therionarca	<u>41. 1</u>	Trissago palustris	
Theristron	<u>40. 2</u>	53. 1	
Thya	27. 2	Trogetes	27. 2
θύερα	21. 1	Turbet	45. 2
Thymelæa	<u>33. 2</u>	V.	
Thuion	27. 2	Valeriana maior & mi-	

nor	49. 2	Vlma	
Valeriana pratēsis	50. 1	Vinca per	
Veratrum album	49. 1	Vnguentaria g	
Veratrum nigrū	ibidē	Volubilis maior	4.
Verbascum syluestre		Volucrum	43. 1
56. 1		Vua dæmonum	11. 1
Vernix	19. 1	X.	
Viburnum	31. 1	Xylobalsamum	40. 1
Viminalis porta, quæ &		Xylon	40. 2
querculana	9. 2	Xylon Gossipion	ibidē.
Vinciboscum	43. 2	Y.	
Vineale reuelium	45. 2	Yf	26. 2
Virile sacerdotis	50. 1	Z.	
Viscum	10. 1	Zegir	38. 2
Viuebant antiqui glan		ζυγία	25. 1
de	5. 1	Zopissa	14. 2
Viurna	31. 1	Finis.	

# Lex gallicarum

## DICTIONVM.

<b>A.</b>		Buysson	<u>4. I</u>
Alkermes	<u>13. 2</u>	Butoesne	<u>56. I</u>
Alisier, alises	ibidē	<b>C.</b>	
Aulneaulx	<u>25. 2</u>	Cabaret	<u>36. 2</u>
Aulne	<u>25. I</u>	Canelle	<u>37. 2</u>
<b>B</b>		Cedre	<u>23. I</u>
Baguenaulde	<u>33. 2</u>	Charme	<u>25. I</u>
Blanche putain	ibidē	Chefnaye	<u>4. I</u>
Bleu	<u>37. I</u>	Chefne	<u>9. 2</u>
Boccaige	<u>29. 2</u>	Cypres	<u>18. 2</u>
Bocquet	<u>4. I</u>	Couper ung bois	<u>3. 2</u>
Bois de gaiac	<u>29. I</u>	Cotton	<u>40. 2</u>
Bois de haulte fustaye	<u>3. I</u>	Cramoyfi	<u>13. 2</u>
Bois de plaifance	<u>4. I</u>	Cueillir le gland	<u>3. 2</u>
Bois plante de cypres		<b>D.</b>	
3. 2		Des merueilles	<u>38. I</u>
Bois puant	<u>31. 2</u>	Double poix	<u>14. 2</u>
Bois semé ou planté de di		<b>E</b>	
uerfes sortes darbres	<u>3. 2</u>	Ebene	<u>29. I</u>
Bouleau	<u>25. 2</u>	Ensens	<u>21. I</u>
Bray	<u>14. 2</u>	Entretenir ung bois	
Brasfil	<u>29. I</u>	3. 2	
Bruyeres	<u>30. I</u>	Erable	<u>24. 2</u>
Bugle	<u>46. 2</u>	Escarlate	<u>13. I</u>